UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE-FURG
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO CULTIVO DO CAMARÃO MARINHO
***Litopenaeus vannamei* EM DIFERENTES SISTEMAS E ESTRATÉGIAS**
PRODUTIVAS

FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES

RIO GRANDE, 2023

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Universidade Federal do Rio Grande
Instituto de Oceanografia

Discente: Fellipy Augusto Holanda Chaves
Orientador: Prof. Dr. Luis Henrique da Silva Poersch
Coorientador: Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos

Tese apresentada como parte dos
requisitos para obtenção do grau de
Doutor em Aquicultura no Programa
de Pós-Graduação em Aquicultura da
Fundação Universidade Federal do
Rio Grande

Rio grande, RS
Junho de 2023

ATA 04/2023

DE DEFESA DA 81ª TESE DE DOUTORADO EM AQUICULTURA

No dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniu-se a Banca Examinadora de Tese de Doutorado em Aquicultura, do **FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES**, orientado pelo Prof. Dr. Luis Henrique Poersch composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Luis Henrique Poersch (orientador – IO/FURG), Prof. Dr. Geraldo Kipper Fôes (IO/FURG), Prof. Dr. Rodrigo Randow (UFES) e o Prof. Dr. Walter Seifert (UFSC). Título da Tese: "AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE CAMARÕES MARINHOS." Dando início à defesa, o Coordenador do PPGAq Prof. Dr. Ricardo Vieira Rodrigues, passou a presidência da sessão ao Prof. Dr. Luis Henrique Poersch, que na qualidade de orientador, passou a palavra para o candidato apresentar a Tese. Após ampla discussão entre os membros da Banca e o candidato, a Banca se reuniu sob a presidência do Coordenador. Durante esse encontro ficou estabelecido que as sugestões dos membros da Banca Examinadora devem ser incorporadas na versão final da Tese, ficando a cargo do Orientador o cumprimento desta decisão. O candidato **FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES** foi considerado **APROVADO**, devendo a versão definitiva da Tese ser entregue a Secretaria do PPGAq, no prazo estabelecido nas Normas Complementares do Programa. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pela Banca Examinadora, pelo candidato e pelo Coordenador do PPGAq.

Documento assinado digitalmente
LUIS HENRIQUE DA SILVA POERSCH
 Data: 10/07/2023 15:38:13-0300
 Verifique em <https://validar.f5.gov.br>

PROF. DR. LUIS HENRIQUE POERSCH (ORIENTADOR – IO/FURG)

Documento assinado digitalmente
GERALDO KIPPER FÔES
 Data: 02/07/2023 17:47:34-0300
 Verifique em <https://validar.f5.gov.br>

PROF. DR. GERALDO KIPPER FÔES (IO/FURG)

Documento assinado digitalmente
RODRIGO RANDOW DE FREITAS
 Data: 11/07/2023 06:49:32-0300
 Verifique em <https://validar.f5.gov.br>

PROF. DR. RODRIGO RANDOW (UFES)

Documento assinado digitalmente
Walter Quadros Seifert
 Data: 26/07/2023 17:13:32-0300
 CPF: ***.606.558-11
 Verifique as assinaturas em <https://icafsc.br>

PROF. DR. WALTER SEIFERT (UFSC)

Documento assinado digitalmente
FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES
 Data: 03/07/2023 08:38:04-0300
 Verifique em <https://validar.f5.gov.br>

FELLIPY AUGUSTO HOLANDA CHAVES

Documento assinado digitalmente
RICARDO VIEIRA RODRIGUES
 Data: 02/07/2023 17:39:07-0300
 Verifique em <https://validar.f5.gov.br>

PROF. DR. RICARDO VIEIRA RODRIGUES (coordenador do PPGAq)

SUMÁRIO

61		
62	AGRADECIMENTO	6
63	RESUMO GERAL	7
64	1.INTRODUÇÃO GERAL	9
65	1.1.Sistemas de produção.....	12
66	a)Tecnologia Bioflocos	12
67	b)Multitrófico.....	14
68	c)Salinização	15
69	2.OBJETIVOS.....	17
70	2.1.Objetivo geral	17
71	2.2.Objetivos específicos	17
72	REFERÊNCIA	18
73	CAPÍTULO 1 – ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA	
74	HIPERINTENSIVO DE PRODUÇÃO DE CAMARÃO	22
75	RESUMO	22
76	1.INTRODUÇÃO.....	23
77	2.MATERIAL E MÉTODOS.....	24
78	3.RESULTADOS	26
79	4.DISSCUSSÃO.....	33
80	5.CONCLUSÃO.....	37
81	REFERÊNCIA	38
82	CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA BFT PARA	
83	DIFERENTES ESTRATÉGIAS EM REGIME HIPERINTENSIVO COM DESPESCA	
84	PARCIAL	41
85	RESUMO	41
86	1.INTRODUÇÃO.....	42
87	2.MATERIAIS E MÉTODOS.....	43
88	3.RESULTADOS E DISCUSSÃO	47
89	4.CONCLUSÃO.....	56
90	REFERÊNCIA	58
91	CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO DOS DIFERENTES SISTEMAS	
92	DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO CAMARÃO MARINHO <i>Litopenaeus</i>	
93	<i>vannamei</i>	61
94	RESUMO	61
95	1.INTRODUÇÃO.....	63
96	2.METODOLOGIA.....	65
97	2.1.Aspectos gerais	65
98	2.2.Caracterização dos sistemas analisados	66

99	a)Misto.....	66
100	b)Superintensivo	66
101	c)Multitrófico	67
102	2.2.Análise de viabilidade.....	67
103	3.RESULTADOS	68
104	4.DISSCUSSÃO	74
105	5.CONCLUSÃO.....	77
106	REFERÊNCIAS	79
107	CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA-ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO	
108	CAMARÃO MARINHO (<i>Litopenaeus vannamei</i>) EM SISTEMA BIOFLOCOS COM	
109	SALINIZAÇÃO ARTIFICIAL	82
110	RESUMO	82
111	1.INTRODUÇÃO.....	84
112	2.METODOLOGIA.....	85
113	2.1.Origem dos dados	85
114	a)Salinização	86
115	b)Análise econômica.....	86
116	3.RESULTADO	89
117	4.DISSCUSSÃO	95
118	5.CONCLUSÃO.....	97
119	REFERÊNCIAS	98
120	CONSIDERAÇÕES FINAIS	101
121	SUGESTÃO DE NOVAS PESQUISAS.....	102
122	ANEXO	103
123	PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR.....	103
124	PARTE II – INVENTÁRIO DA FAZENDA.....	103
125	PARTE III – MÃO DE OBRA ANUAL COM A ATIVIDADE PRODUTIVA	
126	(2015/2016)	105
127	PARTE IV – OUTRAS DESPESAS ANUAIS COM A ATIVIDADE PRODUTIVA	105
128	PARTE V – RECEITA TOTAL ANUAL (2015/2016).....	106
129	PARTE VI - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPRESÁRIO.....	106
130	PARTE VII - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....	107
131	PARTE VIII – POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAS DE FINANCIAMENTO	107
132		
133		
134		
135		

AGRADECIMENTO

Ao Prof. Dr. Luis Henrique da Silva Poersch, pela excelente orientação, apoio, paciência e disponibilidade e, principalmente, pelo conhecimento repassado. OBRIGADO!

Aos professores Wilson Wasielesky (Mano), Ricardo Vieria, Marcelo Tesser, Dariano Krummenauer pela disponibilidade e pelo conhecimento repassado, Obrigado.

Ao Prof. Dr. Kilmer Coelho Campos, que foi meu orientador no mestrado e aceitou continuar na caminhada do doutorado como coorientador.

A minha família, Ana Abreu (minha mãe), José Ivan (meu pai), Ivanlize Estácio (minha irmã), Ivan Rios (meu sobrinho) e Juliana Rios (minha sobrinha e que agora está no doutorado e conhecendo o desespero de conseguir esse título abençoado) obrigado pelo apoio e incentivo.

A minha namorada, Cybele Pinheiro Guimarães, que sempre esteve e estará ao meu lado nesta e em todas as futuras caminhadas. Obrigado por todo o carinho, compreensão e amor dedicados para que eu alcance meu objetivo.

Aos meus amigos da vida, Fernando (Jiraya), Edvanda (Ed), Evânia (Branca), Evanda (Preta), Davi (O Sato), Everton (Deixe ele). Sou imensamente agradecido pela amizade, ajuda nos momentos difíceis e por termos partilhado grandes momentos na nossa vida.

Aos meus amigos de graduação que também são amigos para vida toda, Adolfo (Dazu), Odilon (Odi), Alan (Alaniodo) João Paulo (JP). Agradeço também pelo apoio na coleta de dados no mestrado e no doutorado.

Ao Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, pela oportunidade da realização do doutorado. Aos professores e funcionários que colaboram com minha formação acadêmica e a todos que compõem o Projeto camarão.

Aos órgãos de fomento CAPES, CNPq, FAPERGS e FINEP pela concessão dos recursos que financiam a ciência brasileira. E as empresas privadas que apoiam com seus produtos as atividades do Projeto Camarão: Guabi, Trevisan, AllAqua, Inve e Aquatec

169 RESUMO GERAL

170 A aquicultura praticada com o *Litopenaeus vannamei* contou com diversos processos que
171 ajudaram a inovar e aumentar a produção. Entre as inovações desenvolvidas estão os
172 novos sistemas de produção e as diversas estratégias produtivas. As novas tecnologias
173 aplicadas a produção permitiram ganho de produção, aumento da biossegurança, menor
174 necessidade do uso de recurso hídrico, diminuição do lançamento de efluente,
175 aproveitamento dos resíduos para o cultivo de outro organismo e independência da
176 produção. Contudo, apesar de toda a informação técnica sobre o emprego das diferentes
177 tecnologias produtiva ainda há pouca informação sobre a viabilidade financeira-
178 econômica e o impacto das diferentes estratégias na rentabilidade dos empreendimentos.
179 Assim, o objetivo deste trabalho é responder as questões relacionadas aos diferentes
180 métodos produtivos e os seus resultados de rentabilidade. Os dados experimentais são
181 oriundos de experimentos realizados na Estação Marinha de Aquicultura em escala
182 comercial e as informações de implantação dos empreendimentos aquícolas são de
183 origem primária coletadas por meio de entrevistas realizadas diretamente com os
184 produtores ou responsável técnico pelo empreendimento. O capítulo 1 tratou do efeito do
185 cultivo hiperintensivo com diferentes densidades de estocagem sobre a performance dos
186 indicadores zootécnicos e os resultados financeiros caso fossem realizados em uma área
187 de 1 hectare. Os dados analisados demonstraram que a densidade de 500 camarões.m⁻²
188 produziu a melhor relação custo-benefício e que analisando as incertezas é nesta
189 densidade que ocorre o menor risco. O segundo capítulo é uma extensão do primeiro,
190 porém buscou otimizar a produção por meio da adoção da estratégia de despescas parciais
191 e os seus efeitos na rentabilidade do empreendimento instalado na região Sul do Brasil.
192 Os resultados foram comparados considerando a hipótese de não realização de despescas
193 parcial contra uma, duas e quatro despescas parciais. Com relação aos indicadores
194 zootécnicos, com a estratégia de duas despescas parciais foi possível obter os melhores
195 resultados com relação aos gastos com ração, pois nesta condição há o melhor
196 aproveitamento na relação quantidade de ração fornecida e crescimento semanal
197 esperado. Além disso, o uso desta estratégia permitiu alcançar os melhores resultados
198 relativo à viabilidade do empreendimento. Os capítulos 3 e 4 trataram do emprego das
199 novas tecnologias de produção para o cultivo do camarão marinho. O capítulo comparou
200 o sistema fechado (tecnologia de bioflocos), a integração de espécies de diferentes
201 (Multitrófico) e a integração de sistema de produção diferentes (berçários BFT e na fase

202 de engorda o uso das tradicionais de técnicas de produção, sistema misto). As informações
203 relacionadas a implantação do sistema são oriundas de entrevistas em campos. Os dados
204 utilizados para determinar os indicadores zootécnicos foram coletados de experimentos
205 realizados em escala comercial. Os resultados indicam que na comparação entre os
206 diferentes sistemas a integração do sistema de bioflocos com o sistema de produção
207 tradicional oferece menor risco ao investidor com melhor resultado dos indicadores de
208 rentabilidade mesmo com a produtividade menor. Contudo, com a tecnologia de BFT
209 ficou evidente a maior produtividade e com resultados econômicos superiores aos
210 critérios de decisão, porém, este sistema há margem para melhorar os resultados de
211 rentabilidade por meio do planejamento de produtivo e utilização mais eficiente dos
212 recursos, principalmente, quando ao uso da ração visto que este é o insumo mais
213 impactante no processo produtivo. O IMTA apresentou resultado de produção superior
214 ao sistema misto, no entanto, os resultados de produção foram principalmente afetados
215 pelos preços de venda dos produtos e da alta relação entre custo e receita. O último
216 capítulo trata do sistema BFT mais com o uso de salinização artificial. A salinização foi
217 realizada para manter as relações iônicas similares ao balanço iônico encontrado na água
218 marinha. As informações técnicas sobre a salinização e os dados de performance
219 zootécnicas foram coletadas de um empreendimento aquícola destinado a produção do
220 camarão marinho instalado no estado do Rio Grande do Sul na cidade de Tapes. Os dados
221 demonstram que a relação dos indicadores de produção está próxima aos resultados
222 descritos na literatura científica, contudo, os indicadores de rentabilidade mostram que o
223 preço praticado na ocasião comprometeu a viabilidade do empreendimento e que, neste
224 caso, a análise de cenário indica que somente na condição de incremento de preço (30%)
225 e de produção (15%) seria possível tornar o empreendimento economicamente viável.

226 1. INTRODUÇÃO GERAL

227 Entre os anos de 2016 e 2020, a aquicultura mundial apresentou crescimento de
228 9.38% impactada principalmente pela aquicultura continental. Esta modalidade
229 proporcionou, entre os anos de 2012 e 2020, a maior taxa de crescimento (29.5%) e, entre
230 os grupos cultivados, os crustáceos foram os maiores destaque de produção, com o
231 camarão marinho (*Litopenaeus vannamei*) como principal representante. A produção
232 destes organismos cresceu 47.62%, enquanto a produção piscícola teve um incremento
233 de 3.38% (FAO 2022; 2018).

234 Conforme relatam Felix et al. (2020) entre as características que favoreceram a
235 expansão mundial do cultivo do *L. vannamei* estão: rápido crescimento, possibilidade de
236 cultivo em altas densidades, ampla capacidade adaptativa as condições ambientais e baixa
237 demanda proteica.

238 Inicialmente, o cultivo do camarão marinho ocorria em sistema com baixo nível
239 tecnológico e que dependiam das condições ambientais (Ostrensky et al., 2017; Valenti
240 et al., 2021). Estas condições eram determinantes para o sucesso do empreendimento, já
241 que os regimes de marés, regulavam o processo de enchimento e secagem dos viveiros,
242 bem como, o povoamento com e entrada das pós-larvas (Ostrensky et al., 2017).

243 Contudo, novos sistemas, inovações tecnológicas e práticas foram incorporadas a
244 atividade com o objetivo de aumentar a produção e torná-la mais independente das
245 condições ambientais. Adicionalmente, segundo Avnimelech, (2012) os sistemas
246 tradicionais passaram a ganhar destaque negativo devido a possibilidade de poluição
247 ambiental, lançamento de efluente, o uso de grande quantidade de recursos hídricos
248 (HOPKINS, 1995), a disseminação de doenças e fuga de animais. Assim, diversas
249 pesquisas foram realizadas com o intuito de desenvolver novos protocolos e sistemas
250 voltados para a racionalização da produção e busca por sustentabilidade.

251 Na avaliação de Samocha (2019), o desenvolvimento de novos preceitos
252 produtivos tem como marco inicial o surgimento e a rápida disseminação de doenças.
253 Segundo o autor, as doenças foram preponderantes na busca de soluções desencadeado
254 pela baixa biossegurança produtiva.

255 Conforme apontam Timmons e Ebeling (2010) o sistema de recirculação
256 apresentou menor probabilidade de entrada e disseminação de doenças. Além disso, tem
257 como característica o tratamento dos resíduos em local separado e com o uso de biofiltros
258 para remoção dos compostos nitrogenados do RAS (*Recirculating Aquaculture Systems*).

259 Destaca-se também o tratamento de resíduos em sistemas fechados e de forma
260 simultânea, ou seja, no mesmo ambiente onde estaria a espécie alvo ocorreria o tratamento
261 dos resíduos por meio da comunidade microbiana, que estaria agregada na forma de
262 flocos microbianos, ou bioflocos (Samocha, 2019). No entanto, este sistema demanda
263 mão de obra especializada, alto consumo de energia e comparado com outros métodos de
264 produção necessita ser praticado com elevada densidade de estocagem para compensar
265 os custos de instalação (Hanson et al., 2013)).

266 Corroborando com o tema, Chopin et al. (2001) descreveram outra possibilidade
267 para o tratamento do efluente, mas em compartimentos distintos e com o uso de uma
268 espécie secundária de nível trófico inferior ao do organismo principal cultivado. O
269 principal aspecto deste sistema passou a ser o aproveitamento dos resíduos gerados que
270 seriam utilizados como nutriente ou fonte de alimento para desenvolvimento do
271 organismo secundário e ficou conhecida com aquicultura integrada multitrófica (IMTA).

272 Paralelo aos métodos de cultivo citados, há também a possibilidade de integração
273 com diferentes sistemas produtivos. Conforme Wasielesky et al. (2020) e Krummenauer
274 et al. (2011) demonstraram com a utilização do sistema BFT na produção de pós-larva na
275 fase de berçários e engorda. A adoção desta prática melhorou o aproveitamento da área
276 com ganhos de produtividade e economia na utilização dos recursos hídricos. Contudo, o
277 sistema apresentou problemas com a geração de resíduos sólidos, que podem ser
278 prejudiciais aos animais cultivados. Assim, é essencial adaptar o sistema utilizado para
279 operar de forma integrada com o IMTA, que pode ser uma viável alternativa para
280 tratamento dos resíduos gerado.

281 Novamente ao abordar a necessidade de desenvolvimento de novos preceitos
282 produtivos, o processo de inovação tecnológica também permitiu a independência da
283 produção do camarão marinho das regiões costeiras. Segundo Boyd e Thunjai (2003)
284 diversos países passaram a adaptar o processo de produção do *L. vannamei* para água
285 interiores e adotando a estratégia de salinização com o objetivo de afastar os cultivos de
286 locais contaminados e diminuir o risco do surgimento de doença. Importante destacar que
287 para o sucesso desse processo de salinização é primordial antes conhecer e atender as
288 relações iônicas exigidas fisiologicamente pelo organismo cultivado. Neste processo
289 deve-se realizar a análise de íons da água para conhecer suas carências e, posteriormente,
290 a correção do balanço iônico. Ao longo dos ciclos de produção, é necessário realizar
291 novas correções (Boyd et al., 2002; Boyd e Thunjai, 2003).

292 Ao mesmo tempo com os novos processos de produção e inovações tecnológicas
293 ocorreram também mudanças consideráveis em relação a etapa do planejamento
294 produtivo. Ao longo dos anos, inúmeros estudos demonstraram a viabilidades técnicas do
295 sistema fechado com diferentes densidades e ainda com diferentes estratégias de
296 despescas parciais (Silveira et al., 2020; Silveira et al., 2022; Krummenauer et al., 2011).
297 O sistema de BFT, devido a sua alta capacidade produtiva tem como característica
298 alcançar valores de produtividade mais de 10 vezes superiores aos sistemas de produção
299 tradicionais. Porém é necessário conhecer a melhor relação insumo/produto para otimizar
300 a produção e a relação custo/benefício (Silveira et al., 2022; Krummenauer et al., 2011).
301 Adicionalmente, em relação ao sistema multitrófico, a estratégia utilizada deve adequar
302 as espécies em relação às suas necessidades (Chopin et al., 2001; Poli et al., 2019).

303 Assim, mesmo com as diferentes formas de produzir, novas tecnologias e adoção
304 das diferentes estratégias produtivas, há lacunas de conhecimento para responder as
305 questões de viabilidade no curto e no longo prazo para os sistemas fechados. Por exemplo,
306 Rego et al. (2017a) relataram, ao comparar o sistema de BFT com os sistemas
307 tradicionais, que o BFT pode ser uma importante alternativa para produção do camarão
308 marinho no nordeste brasileiro. Almeida et al. (2021) mostraram que adoção de densidade
309 elevadas (400 camarões.m⁻²) e os preços diferenciados praticados no Sul do Brasil
310 tornaram o BFT economicamente viável. Nesse sentido, é imprescindível o
311 conhecimento, a coleta e a análise de informação a respeito das questões de viabilidade
312 econômica dos sistemas fechados no Brasil.

313 Santos et al. (2002) também destacaram o papel da estratégia produtiva e da
314 importância de uma avaliação do custo e retorno financeiro-econômico. Segundo os
315 autores, a avaliação deve considerar o tamanho da empresa, a relação entre custos,
316 rendimento e produção esperada; eficiência da mão de obra e dos equipamentos. Martin
317 et al. (1998) e Santos et al. (2002) ressaltaram que para uma avaliação apropriada é
318 necessário o levantamento prévio de todos os prováveis gastos e, conseqüentemente, a
319 criação de um sistema próprio de análise de custos.

320 Campos (2006) e Dias (2017) corroboraram com os relatos dos autores
321 supracitados e enfatizam que, para a carcinicultura realizada em sistemas tradicionais, a
322 carência de informação quanto ao uso dos insumos e seus custos, bem como, o
323 conhecimento sobre a volatilidade dos preços causou aos produtores perdas econômicas
324 diante da necessidade de mudança de estratégia. Adicionalmente, Araujo et al. (2017) e
325 Monteiro et al. (2019) destacaram que os produtores de camarão marinho operaram em

326 situação de ineficiência técnica, ou seja, utilizam mais insumos que o necessário e que a
327 melhora técnica e, conseqüentemente, econômica ocorreria com mudança do manejo.

328 O critério para tomada de decisão pode gerar mudança na forma de produzir e na
329 interação entre os concorrentes, fornecedores e consumidores. Claro que é necessário
330 conhecer o fluxo de caixa do empreendimento (Bordeaux-Rêgo, 2013). Nesse sentido,
331 Martin et al. (1998) caracterizaram a ferramenta de fluxo de caixa como instrumento
332 essencial para avaliar a situação atual da empresa e/ou como dispositivo de projeção da
333 situação da empresa sobre condições determinística. Além disso, é por meio desta
334 ferramenta que é possível calcular outros indicadores que medem a rentabilidade do
335 empreendimento no curto e longo prazo e possibilita identificar os principais desembolsos
336 e fontes de receita (Martin et al. 1998; Santo, 2002).

337 Por fim, em virtude do exposto, fica evidente a importância de se conhecer os
338 diversos sistemas sobre o aspecto do funcionamento técnico, exigências tecnológicas e as
339 relações das diversas formas de estratégias que podem ser utilizadas e os impactos
340 gerados no processo de tomada de decisões sobre o ponto de vista financeiro das empresas
341 aquícolas.

342 **Sistemas de produção**

343 ***a) Tecnologia de Bioflocos***

344 O sistema de bioflocos apresenta elevada capacidade produtiva (quando
345 comparado aos sistemas tradicionais ,ou seja, o sistema extensivo, semi-intensivo e
346 intensivo), exige menor demanda hídrica (Krummenauer et al., 2014), apresenta maior
347 biossegurança e racionalização do uso de recursos (Avnimelech, 2012; Felix et al., 2020).

348 O sucesso da tecnologia de bioflocos está estreitamente relacionado com o
349 estabelecimento da comunidade de microrganismos. A ideia da tecnologia BFT é
350 favorecer o desenvolvimento de microrganismo que reciclem os compostos nitrogenados
351 e os convertam em biomassa proteica (Hargreaves, 2013; Wasielesky et al., 2006). O
352 sistema opera por meio do aproveitamento do nitrogênio amoniacal total, NAT, (oriundo
353 das excretas e restos de alimentos) transformando em biomassa proteica e em compostos
354 menos tóxicos através de duas vias: a) bactérias heterotróficas, seu desenvolvimento é
355 estimulado por meio da relação carbono e nitrogênio (C/N). No processo de conversão
356 do nitrogênio, é utilizado 15g de carbono orgânico para cada 1,0 g de nitrogênio assim
357 por meio desta transformação ocorre a formação da biomassa bacteriana; b) bactérias
358 quimioautotróficas (nitrificantes) que transformam o nitrogênio em nitrato, forma menos

359 tóxica, utiliza carbono de origem inorgânica no processo de nitrificação (Chen et al.,
360 2006; Ebeling et al., 2006). É importante destacar que ambos os processos demandam
361 oxigênio.

362 Krummenauer et al. (2011) relataram que a elevada produtividade é beneficiada
363 pela estabilidade da qualidade de água após a instauração da comunidade bacteriana que
364 é responsável por converter a amônia a nitrato e que ao assimilar o nitrogênio forma
365 biomassa bacteriana. Este processo é responsável pela formação dos flocos microbianos
366 que também são utilizados na suplementação alimentar (Wasielesky et al., 2006).

367 A instalação de unidade de produção necessita de estruturas específicas como:
368 geomembrana, para evitar o contato água terra; estufas, para manutenção da temperatura;
369 sistema de aeração constante e que mantenha a concentração de oxigênio entre 5 e 6mg/L.
370 Sistemas de suporte, como gerador. Além disso, os sistemas super e hiperintensivo
371 demandam grandes volumes de ração e energia o que afeta o custo de instalação e
372 operação.

373 Rego et al. (2017b) ressaltaram a análise prévia com relação aos custos de
374 implantação e os custos de produção, bem como, a vulnerabilidade do sistema frente às
375 oscilações de preços. O sistema de bioflocos pode ser uma importante alternativa
376 econômica para a produção de camarão no Nordeste (Rego et al., 2017a).
377 Adicionalmente, Almeida et al. (2021) descrevem que o sistema de bioflocos apresenta
378 elevada rentabilidade quando instalados em regiões que praticam preços diferenciados,
379 ou seja, locais com baixa ou nenhuma produção de crustáceos, mas com alta demanda
380 pelo produto.

381 É importante salientar que avaliações em relação ao investimento e rentabilidade
382 consideraram apenas uma situação, ou seja, o cultivo seria realizado considerando apenas
383 um tipo de densidade de estocagem. No entanto, é relevante considerar as possibilidades
384 de mudanças de estratégias e os seus impactos nos indicadores de rentabilidade. Nesse
385 sentido, Campos (2006), ao discorrer sobre a importância de uma análise financeira
386 prévia, ressaltar a importância do planejamento na carcinicultura com vista a elencar os
387 possíveis cenários e estratégias a fim de evitar prejuízos futuros. Rego et al. (2017b)
388 complementam descrevendo a variação do preço de venda do camarão como risco a ser
389 constantemente avaliado visto que os produtores são tomadores de preço.

390 Outro importante fator a ser considerado no planejamento produtivo com a
391 tecnologia BFT é uso de insumo. Hanson et al. (2013), Rego et al. (2017a) e Almeida et
392 al. (2021) foram categóricos ao afirmar que o gasto com ração constitui a maior parte dos

393 desembolsos na etapa de produção, sendo assim, é primordial identificar a estratégia que
394 melhor beneficie o aproveitamento do alimento no ganho de biomassa.

395 ***b) Sistema Multitrófico***

396 A aquicultura multitrófica (IMTA) consiste em compartilhar e aproveitar os
397 diversos recursos e, particularmente, os resíduos. O sistema permite, por meio da partilha,
398 a interação entre as espécies de diferentes níveis tróficos. Estes organismos com funções
399 ecológicas complementares, atuam em harmonia para biomitigar a geração dos resíduos
400 (Chopin et al., 2001).

401 Em sistemas de produção aquícolas, a geração de resíduos (seja na forma de
402 sólidos ou de nutrientes) pode afetar negativamente o meio ambiente ou a espécie
403 cultivada, por exemplo: por meio do efluente lançado em desacordo com as normas
404 ambientais ou devido ao excesso de algum composto tóxico para os animais (Gaona et
405 al., 2017; Lin e Chen, 2001, 2003). Nesse sentido, o sistema integrado multitrófica é
406 potencialmente a ferramenta ideal para resolver este problema, visto que, tal mecanismo
407 pode atuar de forma isolada com espécies filtradoras na retirada do excesso de sólidos
408 (Holanda et al., 2020); com organismos fotossintetizantes na extração do excesso de
409 nutrientes (Patarra, 2019) ou ambos conjuntamente. Contudo, é relevante ressaltar que a
410 escolha dos organismos utilizados deve considerar a inclusão do critério valor econômico
411 (Chopin et al., 2001). A escolha não deve ser pautada apenas na finalidade técnica é
412 preciso agregar valor ao sistema. Logo, ao obedecer a este critério, o sistema tornar-se
413 menos vulnerável as incertezas mercadológicas e, adicionalmente, as biológicas (como o
414 surgimento de doenças). Outro aspecto importante é que a visão do IMTA alterou a
415 percepção sobre produtos e resíduos. Neste sistema, o resíduo é utilizado para gerar um
416 outro produto, sendo assim, agora este passa a ser visto como insumo.

417 Ao estruturar o sistema multitrófico, é necessário considerar a densidade,
418 proporção entre as espécies e a condição local. O dimensionamento do sistema IMTA
419 também deve considerar a instalação de equipamentos que atendam a demanda de
420 oxigênio das diferentes espécies e as características da produção (extensiva, semi-
421 intensiva, intensiva e superintensiva), além disso, é necessário dimensionar as bombas
422 para recircular a água.

423 O aspecto de sustentabilidade atribuído ao IMTA segundo Barrington et al. (2010)
424 constitui um diferencial na etapa de venda, já que há valorização no preço do produto
425 quando comparado com o mesmo produto, porém oriundo dos sistemas tradicionais. No

426 entanto, o mesmo autor relatou que os consumidores têm pouco conhecimento sobre a
427 importância dos produtos oriundos do sistema IMTA evidenciando a necessidade de uma
428 campanha para informar sobre a vantagem destes produtos.

429 No Brasil, há legislação que trata do sistema integrada está definida na resolução
430 emitida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 413, 2009). Segundo a
431 resolução, os sistemas integrados que comprovem o uso racional dos recursos, a redução
432 de sólidos, tratamento eficaz do efluentes e a biossegurança podem ser enquadrados como
433 de menor impacto ambiental e, conseqüentemente, terão redução do tempo do processo
434 e do valor do licenciamento.

435 Em sistemas superintensivos, como no caso do BFT, Holanda et al. (2020)
436 realizaram em escala piloto a integração entre o camarão marinho e a tainha (*Mugil liza*)
437 e constataram que foi possível aumentar o valor de biomassa para produção de camarão
438 com redução significativa dos sólidos suspenso totais (SST). No entanto, os autores
439 relatam a necessidade da adoção de novas análises em escala comercial e, principalmente,
440 analisar o sistema IMTA associada ao sistema BFT sob o ponto de vista econômico.

441 c) Salinização

442 Boyd e Thunjai (2003) ao avaliarem a interiorização da produção do *L. vannamei*
443 na Tailândia, China, Equador e EUA (que tinham como objetivo a expansão da produção
444 e fugir de zona com forte incidência de doenças) identificaram que a prática de salinização
445 (por meio de salmoura marinha) aplicada em águas continentais favoreceu o cultivo no
446 novo ambiente devido a presença dos elementos mais representativos (Tabela 1).

447

448 **Tabela 1** – Descrição da concentração (mg.L⁻¹) e participação na composição da água
449 marinha dos íons majoritários. A concentração total dos íons da água do mar corresponde
450 a 35,000 mg.L⁻¹.

	Íons	Símbolo	Concentração (mg.L ⁻¹)	Participação na composição da água do mar (%)
Cátions	Sódio	Na ⁺	10,50	30,00
	Magnésio	Mg ²⁺	1,35	3,86
	Cálcio	Ca ²⁺	400,00	1,14
	Potássio	K ⁺	380,00	1,09
Ânions	Cloreto	Cl ⁻	19,00	54,29
	Sulfato	SO ₄ ²⁻	2,70	7,71
	Bicarbonato	HCO ₃ ⁻	142,00	0,41
Total			34,47	98,50

451

452 Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento de novos sistemas, a salinização
453 artificial da água de cultivo passou de correção do desbalanço iônico para um sistema
454 potencialmente independente em relação as características da água e da localização do
455 empreendimento. Para isso, além da presença dos elementos majoritários é preciso que
456 estes íons estejam presentes, mas nas proporções corretas (Tabela 2).

457

458 **Tabela 2** – Descrição das relações e proporção iônicas que interferem na fisiológica do
459 *Litopenaeus vannamei*.

Relações iônicas	Proporções iônicas
Mg: Ca	3.4:1
Mg: Ca: K	3.38: 1: 0.95
Cl: Na: Mg	14.1: 7.8: 1

460

461 Este aspecto, ligado às características do sistema de bioflocos (entre elas, a
462 possibilidade a operar numa área bem menor e com menor volume hídricos) constitui um
463 ponto positivo que pode funcionar otimizando o sistema. Krummenauer et al. (2014)
464 ainda destacam o sucesso da reutilização da água do sistema de BFT sem que esta cause
465 problemas em novos ciclos. Neste aspecto, a possibilidade de reutilizar a mesma água em
466 vários ciclos pode ser uma importante medida para racionalizar o uso de insumos e reduzir
467 os custos de produção.

468 Outra importante característica que favorece a utilização associada do BFT com o
469 processo de salinização artificial é o próprio animal: *L. vannamei*. A espécie possui alta
470 capacidade adaptativa às variações de salinidade. Isso permite que o cultivo ocorra sem
471 perdas significativas da produção caracterizado por meio dos índices zootécnicos. Assim,
472 este camarão marinho possui a capacidade de tolerar variações de salinidade que vão de
473 0.5‰ a 40‰ (Saoud et al., 2003).

474 Com relação a possibilidade da produção do camarão em sistema BFT, Maicá et
475 al. (2012) e Moura et al. (2021) demonstraram que é possível trabalhar com pós-larvas de
476 camarão em salinidade de 2 a 3. Na fase de engorda, Pinto et al. (2020) relataram
477 resultados com densidade de 250 camarões.m⁻³ que aponta para a melhor relação custo-
478 benefício. Contudo, é importante salientar que é possível adotar diversas estratégias de
479 salinização e que estas podem interferir nos indicadores de rentabilidade do projeto. Nesse
480 sentido, diante dos resultados positivos que inferem na viabilidade técnica da produção é
481 necessário verificar também a viabilidade do sistema perante a hipótese de rentabilidade
482 e identificar fatores mais impactantes tanto de forma negativa como positiva.

483

484 **2. OBJETIVOS**

485 2.1.Objetivo geral

486 Determinar a viabilidade econômica dos diversos sistemas de produção do
487 camarão marinho (*Litopenaeus vannamei*) bem como as atuais estratégias produtivas e
488 avaliar a relação financeira entre a produção hiperintensiva e os gastos com ração.

489 2.2.Objetivos específicos

- 490 • Avaliar economicamente o sistema hiperintensivo de produção de camarão em
491 sistema BFT e seus efeitos sobre os gastos com alimentação sobre a condição de
492 incertezas (Capítulo I);
- 493 • Avaliar financeiramente o sistema BFT em condição de produção hiperintensiva
494 por meio de diferentes estratégias de despesca parcial, bem como, o efeito sobre
495 o crescimento (Capítulo II);
- 496 • Avaliar e fornecer informações acerca do investimento necessário nos novos
497 sistemas produtivos e os elementos que causam os maiores impactos (Capítulo
498 III);
- 499 • Avaliar e trazer informações quanto a viabilidade financeira econômica do
500 sistema BFT operando a nível comercial usando o processo de salinização
501 artificial com densidade superintensiva no cultivo do camarão marinho na região
502 Sul do Brasil (Capítulo IV).

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515 **REFERÊNCIA**

- 516 Araujo, J.A., Kedylla, A., Norões, M., Monteiro, J.V., César Pereira De Araújo, R., Pinto
517 Da Silva, F., 2017. Eficiência Produtiva das Fazendas de Carcinicultura no Estado
518 do Ceará. Rev. Econ. e Sociol. Rural 56, 35–50. [https://doi.org/10.1590/1234-](https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790560103)
519 [56781806-94790560103](https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790560103)
- 520 Avnimelech, Y., 2012. Biofloc technology – A Practical Guide Book, 2d Edition. World
521 Aquac. Soc. Bat. Rouge, Louisiana, United States. 258.
522 <https://doi.org/10.13140/2.1.4575.0402>
- 523 Bordeaux-Rêgo, R. et al, 2013. Viabilidade econômico-financeira de projetos, 4^o. ed. Rio
524 de Janeiro.
- 525 Boyd, C.A., Chaney, P.L., Boyd, C.E., Rouse, D.B., 2009. Distribution of ground water
526 suitable for use in saline-water aquaculture in central and west-central alabama. J.
527 Appl. Aquac. 21, 228–240. <https://doi.org/10.1080/10454430903114048>
- 528 Boyd, C.E., 2002. Dissolved Salts in Water for Inland , Low-Salinity Shrimp Culture 40–
529 45.
- 530 Boyd, C.E., Thunjai, T., 2003. Concentrations of major ions in waters of inland shrimp
531 farms in China, Ecuador, Thailand, and the United States. J. World Aquac. Soc. 34,
532 524–532. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2003.tb00092.x>
- 533 Campos, C., 2006. Alternativa econômica para o novo rural do nordeste brasileiro : o
534 cultivo do camarão *litopenaeus vannamei* em northeast of brazil : fresh water shrimp
535 farming. GEPEC 10, 40–53.
- 536 Chen, S., Ling, J., Blancheton, J.P., 2006. Nitrification kinetics of biofilm as affected by
537 water quality factors. Aquac. Eng. 34, 179–197.
538 <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.09.004>
- 539 Chopin; Buschamann; Halling; Troell; Kautsky; Neori; Kraemer; Zertuche-González;
540 Yarish; Neefus, 2001. Integrating seaweeds into marine aquaculture systems : a key
541 toward sustainability. J. Phycol 986, 975–986.
- 542 Chopin, T., 2021. Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) is a concept, not a
543 formula. Int. Aquafeed 18–19.
- 544 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Fóes, G.K., Rosas, V.T., Wasielesky,
545 W., 2022. The effect of partial harvest on production and growth performance of
546 *Litopenaeus vannamei* reared in biofloc technologic system. Aquaculture 546.
547 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737408>
- 548 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Rosas, V.T., Wasielesky, W., 2020.
549 Hyperintensive stocking densities for *Litopenaeus vannamei* grow-out in biofloc
550 technology culture system. J. World Aquac. Soc. 51, 1290–1300.
551 <https://doi.org/10.1111/jwas.12718>
- 552 Almeida, M.S., Carrijo-Mauad, J.R., Gimenes, R.M.T., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S.,

- 553 Poersch, L.H., Wasielesky, W., Fóes, G.K., 2021. Bioeconomic analysis of the
554 production of marine shrimp in greenhouses using the biofloc technology system.
555 *Aquac. Int.* 29, 723–741. <https://doi.org/10.1007/s10499-021-00653-1>
- 556 Dias, J.M., 2017. Avaliação econômica da produção de camarão (*litopenaeus vannamei*)
557 sob a condição de risco no município de acaraú - estado do ceará. Universidade
558 Federal do Ceará (UFC). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- 559 Ebeling, J.M., Timmons, M.B., Bisogni, J.J., 2006. Engineering analysis of the
560 stoichiometry of photoautotrophic, autotrophic, and heterotrophic removal of
561 ammonia-nitrogen in aquaculture systems. *Aquaculture* 257, 346–358.
562 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.03.019>
- 563 FAO, 2022. World Fisheries and Aquaculture, FAO: Rome, 2022.
- 564 FAO, 2018. the state of world fisheries and aquaculture- meeting the sustainable
565 development goals. Rome.
- 566 Felix, Samocha, Menaga, 2020. Vannamei Shrimp Farming, Vannamei Shrimp Farming.
567 CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003083276>
- 568 Gaona, C.A.P., de Almeida, M.S., Viau, V., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2017. Effect
569 of different total suspended solids levels on a *Litopenaeus vannamei* (Boone, 1931)
570 BFT culture system during biofloc formation. *Aquac. Res.* 48, 1070–1079.
571 <https://doi.org/10.1111/are.12949>
- 572 Hanson, T., Ph, D., Morris, T., 2013. Economic Analyses Project Rising Returns For
573 Intensive Biofloc Shrimp Systems. *Glob. Aquac. Advocate* 2011–2013.
- 574 Hargreaves, John A, 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture Southern
575 regional aquaculture center. *SRAC Publ.* 1–12.
- 576 Hargreaves, J.A., 2006. Photosynthetic suspended-growth systems in aquaculture. *Aquac.*
577 *Eng.* 34, 344–363. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.009>
- 578 Holanda, M., Santana, G., Furtado, P., Rodrigues, R.V., Cerqueira, V.R., Sampaio, L.A.,
579 Wasielesky, W., Poersch, L.H., 2020. Evidence of total suspended solids control by
580 *Mugil liza* reared in an integrated system with pacific white shrimp *Litopenaeus*
581 *vannamei* using biofloc technology. *Aquac. Reports* 18.
582 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100479>
- 583 Hopkins, j. S.M.R.D., 1995. Environmental Impacts of Shrimp Farming with Special
584 Reference to the Situation in the Continental United States. *Estuar. Res. Fed.* 18, 25–
585 42.
- 586 Krummenauer, D., Peixoto, S., Cavalli, R.O., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2011.
587 Superintensive culture of white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in a biofloc
588 technology system in Southern Brazil at different stocking densities. *J. World*
589 *Aquac. Soc.* 42, 726–733. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2011.00507.x>
- 590 Krummenauer, D., Samocha, T., Poersch, L., Lara, G., Wasielesky, W., 2014. The reuse
591 of water on the culture of pacific white shrimp, *litopenaeus vannamei*, in BFT

- 592 system. J. World Aquac. Soc. 45, 3–14. <https://doi.org/10.1111/jwas.12093>
- 593 Lin, Y.-C., Chen, J.-C., 2001. Acute toxicity of ammonia on *Litopenaeus vannamei*
594 Boone juveniles at different salinity levels. J. Exp. Mar. Bio. Ecol. 259, 109–119.
- 595 Lin, Y.C., Chen, J.C., 2003. Acute toxicity of nitrite on *Litopenaeus vannamei* (Boone)
596 juveniles at different salinity levels. Aquaculture 224, 193–201.
597 [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(03\)00220-5](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(03)00220-5)
- 598 Maicá, P.F., de Borba, M.R., Wasielesky, W., 2012. Effect of low salinity on microbial
599 floc composition and performance of *Litopenaeus vannamei* (Boone) juveniles
600 reared in a zero-water-exchange super-intensive system. Aquac. Res. 43, 361–370.
601 <https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2011.02838.x>
- 602 Martin, N.B., Serra, R., Oliveira, M.D.M., Ângelo, J.A., Okawa, H., 1998. Sistema
603 integrado de custos agropecuários - CUSTAGRI. Informações Econômicas v. 28,
604 n.1 28, 7–28.
- 605 Monteiro, J.V., Norões, A.K.M., Araújo, R.C.P. de, Araújo, J.A., Silva, F.P. da, 2019.
606 Metafronteira de produção e eficiência técnica da carcinicultura nos estados do
607 Ceará e Rio Grande do Norte. Rev. Econ. e Sociol. Rural 57, 530–544.
608 <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.179534>
- 609 Moura, P.S. de, Wasielesky, W., Serra, F. da P., Braga, A., Poersch, L., 2021. Partial
610 seawater inclusion to improve *Litopenaeus vannamei* performance in low salinity
611 biofloc systems. Aquaculture 531, 735905.
612 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735905>
- 613 Nunes, A.J.P., Feijó, R.G., 2016. Convivência com o vírus da mancha branca no cultivo
614 de camarão marinho no Brasil. Rev. da ABCC 30–36.
- 615 Ostrensky, A., Pont, D.J.S.G.D., Cozer, G.G.C.-W.M.V.F.G.N., Silva, R.F. de A.G.-M.U.
616 de A.T. da, 2017. a Produção Integrada Na Carcinicultura Brasileira Volume I.
617 Curitiba.
- 618 Patarra, 2019. Aquacultura Multi-Trófica Integrada (IMTA) e as macroalgas marinhas.
619 UAciência 29.
- 620 Pinto, P.H.O., Rocha, J.L., do Vale Figueiredo, J.P., Carneiro, R.F.S., Damian, C., de
621 Oliveira, L., Seiffert, W.Q., 2020. Culture of marine shrimp (*Litopenaeus vannamei*)
622 in biofloc technology system using artificially salinized freshwater: Zootechnical
623 performance, economics and nutritional quality. Aquaculture 520.
624 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734960>
- 625 Poli, M.A., Legarda, E.C., Lorenzo, M.A. De, Martins, M.A., Vieira, N., 2019. Pacific
626 white shrimp and Nile tilapia integrated in a bio floc system under di fferent fi sh-
627 stocking densities 498, 83–89. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.08.045>
- 628 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017a. Financial viability of inserting
629 the biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* farm: a case study
630 in the state of Pernambuco, Brazil. Aquac. Int. 25, 473–483.
631 <https://doi.org/10.1007/s10499-016-0044-7>

632 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017b. Risk analysis of the insertion
633 of biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* production in a farm
634 in Pernambuco, Brazil: A case study. *Aquaculture* 469, 67–71.
635 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.12.006>

636 Samocha, T.M., 2019. Sustainable Biofloc Systems for, Sustainable Biofloc Systems for
637 Marine Shrimp.

638 Santos, G. J.; Marion, J. C.; Segatti, S., 2002. Administração de custo na
639 agropecuária.pdf, 3rd ed. Editora Altas, São Paulo.

640 Saoud, I.P., Davis, D.A., Rouse, D.B., 2003. Suitability studies of inland well waters for
641 *Litopenaeus vannamei* culture. *Aquaculture* 217, 373–383.
642 [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(02\)00418-0](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00418-0)

643 Timmons, M.B., Ebeling, J.M., 2010. Recirculating Aquaculture 2nd Edition,
644 Aquaculture.

645 Valenti, W.C., Barros, H.P., Moraes-Valenti, P., Bueno, G.W., Cavalli, R.O., 2021.
646 Aquaculture in Brazil: past, present and future. *Aquac. Reports* 19, 100611.
647 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>

648 Wasielesky, W., Atwood, H., Stokes, A., Browdy, C.L., 2006. Effect of natural
649 production in a zero exchange suspended microbial floc based super-intensive
650 culture system for white shrimp *Litopenaeus vannamei*. *Aquaculture* 258, 396–403.
651 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.04.030>

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664 **CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO ECONÔMICA EM SISTEMA BFT E SEUS**
665 **EFEITOS SOBRE OS CUSTOS OPERACIONAIS E CONDIÇÕES DE**
666 **INCERTEZAS**

667

668 Autores: Fellipy Augusto Holanda Chaves¹; Kilmer Coelho Campos²; Geraldo Kipper
669 Fóes¹; Wilson Wasielesky Jr¹; Luis Henrique Poersch¹.

670 ¹Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Instituto de Oceanografia, Universidade
671 Federal do Rio Grande - FURG; Rua do Hotel, n°2, Cassino, Rio Grande, RS, Brazil.
672 CEP: 96210-030.

673 ²Programa de Pós-graduação em Economia Rural, Departamento de Economia Agrícola,
674 Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 2977-
675 Campus do Pici, Bloco 826. Fortaleza-Ceará, Brasil. CEP:60440-970.

676 Autor por correspondência: Universidade Federal do Rio Grande (PPGAq-IO-FURG),
677 Rua do Hotel n° 2, Cassino, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96210-030 E-
678 mail: fellipychaves@gmail.com (Fellipy A.H. Chaves).

679

680 **RESUMO**

681 A tecnologia de bioflocos permite o aumento da densidade e o aumento da produtividade
682 com baixo impacto ambiental. No entanto, são poucos os estudos que demonstram a
683 viabilidade financeira dessa tecnologia. O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade
684 financeira do sistema BFT em condições hiperintensivas, bem como identificar entre as
685 densidades utilizadas, 400 (T400), 500 (T500) e 600 (T600) camarões/m² que possui a
686 maior capacidade de retorno definida pelos indicadores financeiros. Inicialmente, para os
687 indicadores zootécnicos, houve diferença significativa entre T400 e T500 e T600 para
688 peso final, biomassa final e produtividade, mas não há diferença entre T500 e T600 para
689 esses parâmetros. Quanto aos indicadores financeiros, o tratamento que teve melhor
690 resultado foi o T500 com maior valor bruto receita (\$ 79.951,38), margem bruta (39,68%)
691 e lucratividade (\$ 22.712,24). Adicionalmente, o T500 foi o tratamento mais eficiente em
692 termos de ração (\$1,689), energia (\$0,497) e gasto total (\$3,673) em valores médios de
693 custo por quilo e, em termos de sucesso, este tratamento teve a menor probabilidade de
694 obter um lucro menor que zero (0,74%).

695 **Palavras-chaves:** Hiperintensivo, camarão marinho, manejo, avaliação econômica

696 Artigo Submetido: a revista Aquaculture Economics & Management

697 1. INTRODUÇÃO

698 A carcinicultura brasileira despontou rapidamente com índices de produtividades
699 superiores aos *players* internacionais (ROCHA, 2022). Contudo, nos últimos anos, a
700 produção nacional foi severamente prejudicada com o vírus da mancha branca (WSSV)
701 que impactou a atividade com perda significativas de produção (Rezende e Mataveli,
702 2017). Assim, com o intuito de solucionar os desafios, diversos sistemas de produção e
703 manejos foram aprimorados e desenvolvidos.

704 Entretanto, esses diferentes métodos de produção, geram resultados técnicos,
705 econômicos e ambientais diversos. Valenti et al. (2021), destacam o sistema semi-
706 intensivo como o mais praticado, mas é possível encontrar extensivos e intensivos e, mais
707 recentemente, os sistemas superintensivos passaram a ganhar força, principalmente, por
708 meio da tecnologia de Bioflocos (BFT).

709 Quando ao sistema BFT, Krummenauer et al. (2011) argumentam que nesse
710 modelo produtivo é possível trabalhar com altas densidades aumentando a produtividade,
711 além de operar com um sistema mais eficiente no aproveitamento da área. Silveira et al.
712 (2020); Silveira et al. (2022) demonstraram a viabilidade técnica para sistema
713 hiperintensivo com a adoção de despescas parciais.

714 Contudo, os ganhos gerados por esse sistema somente ocorreriam por meio do
715 emprego de tecnologia e mão de obra qualificada, logo, demandaria alto investimento.
716 Fato demonstrado por Rego et al. (2017), quando analisada a viabilidade financeira do
717 sistema BFT comparado aos sistemas produtivos convencionais. Todavia, o autor
718 destacou que este sistema é uma importante alternativa produtiva.

719 Corroborando com essa perspectiva econômica, Hanson et al. (2013) enfatizam o
720 elevado custo operacional. O Custo Operacional Efetivo (COE), como afirmam Almeida
721 et al. (2021) e Rego et al. (2017), pode representar mais de 80% do Custo Total (CT).
722 Vale destacar que o COE é diretamente relacionado com os insumos utilizados na
723 produção (ou seja, atrelado ao manejo). Contudo, estudos que relacionem o sistema
724 superintensivo, produção de camarão e que atenda conjuntamente o manejo e uma análise
725 econômica ainda são escassos.

726 Assim, como objetivo *a priori* da empresa deve ser a maximização do lucro e esta
727 passa pela otimização da produção, o que se busca no processo produtivo é a sua
728 racionalização, visto que, este trata-se da relação entre insumos e seus custos (Varian,
729 2015). A administração adequada dos recursos forneceria meios para realizar uma análise

730 de fluxo de caixa mais realista, além disso, acarretaria uma utilização mais eficiente dos
731 insumos (Santos, Marion, Segatti, 2002).

732 Campos (2006), por exemplo, em seus estudos destacam que os empreendimentos
733 com elevados custos de instalação e operação devem ser constantemente avaliados via
734 custos e retornos. O autor destaca que a situação financeira das empresas pode ser
735 mensurada por meio dos resultados econômicos. Desse modo, esta técnica possibilitaria
736 identificar como os recursos estão sendo empregados, administrados e quais foram seus
737 resultados econômicos, com isso propiciando meios para subsidiar o planejamento
738 técnico e financeiro servindo como ferramenta para auxiliar na tomada de decisão.

739 A produção de camarão apresenta risco seja por problema biológicos (como: peso
740 médio inferior ao esperado ou surgimento de doenças) ou econômicos (causados pelas
741 variações dos preços de insumos e/ou dos produtos). Nesse sentido, a simulação de Monte
742 Carlo (SMC) é um poderoso método para determinar a probabilidade de eventos
743 indesejados. Esta ferramenta permite gerar diversos cenários por meio interação das
744 diversas variáveis por meio da geração de dados aleatório definidos com relação a
745 distribuição de probabilidade.

746 Este estudo tem o objetivo de avaliar economicamente o sistema hiperintensivo
747 de produção de camarão em sistema BFT. Para isso, utilizou-se de técnica de avaliação
748 dos custos e retorno econômicos. A identificação das fragilidades foi constatada com a
749 análise de sensibilidade. Vale destacar que fragilidade refere aos parâmetros que causam
750 maiores impactos no lucro. Adicionalmente, o risco foi mensurado com a Simulação de
751 Monte Carlo.

752

753 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

754 O experimento foi realizado na Estação Marinha de Aquicultura, Universidade
755 Federal do Rio Grande, RS, em nove tanques de 35 m², totalizando uma área de 315 m². Os
756 valores descritos para área total foram transformados para hectares. Os resultados
757 convertidos visando descrever e avaliar o desempenho caso as densidades fossem
758 adotadas em escala comercial. Nesse caso, definiu-se a área total de um hectare (1
759 hectare) e cada tanque com 0,11 (1.111,11m²).

760 Todos os tanques são revestidos com polietileno de alta densidade. O sistema de
761 aeração constituído por soprador de 7,5 HP, cada tanque contendo, a cada 1,5 m², 0,15 m
762 de mangueiras microperfuradas (Aero-tubeTM). Os tanques foram povoados com

763 camarões da espécie *Litopenaeus vannamei* com peso médio de 1,27 g $\pm$ 0,54g. As
764 densidades de 400, 500 e 600 m² com duração de 78 dias.

765 O manejo alimentar seguiu a metodologia sugerida por Yta et al. (2004) que busca
766 determinar a quantidade de ração fornecida por meio, entre outros parâmetros, da
767 padronização do FCA e do crescimento esperado por semana. Com este método é possível
768 definir a distância entre o crescimento esperado do crescimento real em relação a
769 quantidade de ração que deverá ser ofertada.

770 Os custos de cada tratamento constituem a soma dos custos das repetições e estes
771 foram averiguados seguindo a metodologia descrita por Matsunaga et al. (1976) que
772 definiu os custos operacionais efetivos (COE) como fatores utilizados na produção de
773 produto agrícola, portanto, o COE será o somatório do dispêndio com: ração, probiótico,
774 cal hidratada, energia, pós-larva, mão de obra e mão de obra especializada.

775 Os indicadores de rentabilidade dos tratamentos seguem a mesma dinâmica dos
776 custos, ou seja, foram avaliados a partir do somatório das repetições. Assim, foram
777 utilizados os indicadores de Receitas Brutas (RB), Margem Bruta (MB) (Campos, 2003).
778 O primeiro indicador, RB, é obtido pelo preço de venda por quilograma de camarão
779 (US\$/kg) por quantidade produzida. A MB trata-se da diferença entre a RB e COE
780 dividido pelo COE, este resultado está descrito em porcentagem. Para identificar o retorno
781 bruto em relação aos custos aferido foi utilizada a relação entre RB e COE. Para
782 determinar quantas unidades em quilograma (kg) seriam necessários para custear a
783 produção utilizou-se a metodologia definida por Martin et al. (1998). No qual o Ponto de
784 Nivelamento é a relação entre o COE e Preço unitário de venda (US\$/kg). O custo médio
785 total (Cmed_T), custo médio de ração (Cmed_R) e custo médio energia (Cmed_E) é a divisão
786 entre estes custos pelo que foi produzido.

787 O modelo adotado para verificar os resultados econômicos é descrito como
788 determinístico, ou seja, há o conhecimento prévio sobre o preço ofertado pelo mercado,
789 contudo, isso não considera as incertezas. Para tanto, utilizou a metodologia de Análise
790 de Sensibilidade e a Simulação de Monte Carlo (SMC) a partir de valores médios de
791 produção, custos e receitas por tratamento. A análise de sensibilidade foi usada para
792 identificar as variáveis que causariam os maiores impactos percentuais na variável
793 resposta, o Lucro (L), sobre condição *ceterius paribus* (Correia Neto, 2019).

794 O lucro é resultado da incerteza de vários parâmetros. Nesse sentido, as incertezas
795 podem ser definidas por seu comportamento estocástico e sua ocorrência delimitada por

796 suas variações. Nesse aspecto, A SMC é utilizada para verificar a probabilidade de
797 ocorrência de determinado parâmetro (Correia Neto, 2019).

798 O modelo de SMC seguiu o estabelecido para análise de sensibilidade, ou seja, foi
799 elaborado com as variáveis mais sensíveis, contudo o objetivo foi verificar a
800 probabilidade do lucro menor que zero ($L < 0$). Para averiguar a frequência dos eventos
801 utilizou a distribuição triangular, pois os valores mínimos, máximos e médios são
802 conhecidos. Para verificar as relações entre as variáveis foram realizadas 1000 interações
803 por meio do *software Cristal ball*. Assim, de posse dos valores foi possível determinar
804 qual a probabilidade de $L < 0$ para os diferentes tratamentos.

805

806 3. RESULTADOS

807 Os resultados zootécnicos alcançados na produção de camarão em sistema BFT
808 em diferentes densidades estão resumidos na Tabela 1. Inicialmente, os animais foram
809 estocados com o peso médio de 1,27g o que corresponde, em biomassa, por tratamento,
810 a 564,44; 705,56 e 846,46 kg para as densidades de 400, 500 e 600 camarões.m⁻²,
811 respectivamente.

812 **Tabela 1** – Resultados de médias e desvios-padrão dos indicadores zootécnicos da
813 produção de camarão em sistema superintensivo com diferentes densidades de estocagem
814 cultivados durante 78 dias para Peso inicial (Pmed_i); Peso final (Pmed_f); Ganho de peso
815 semanal (GPS_{med}); Biomassa média inicial (Biomassamed_i); Biomassa média final
816 (Biomassamed_f); Consumo total de ração (Consumo total); Sobrevivência; Fator de
817 Conversão Alimentar (FCA_{med}); Produtividade.

	Tratamento 400	Tratamento 500	Tratamento 600
Pmed _i (g)	1,27 ± 0,54	1,27 ± 0,54	1,27 ± 0,54
Pmed _f (g)	12,30 ± 1,13 ^a	12,20 ± 0,26 ^a	10,30 ± 0,8 ^b
GPS _{med} (g)	1,10 ± 0,11	1,09 ± 0,03	0,90 ± 0,08
Biomassamed _i (kg)	564,44	705,56	846,67
Biomassamed _f (kg)	4.470,68 ± 60,59 ^b	5.195,02 ± 37,48 ^{a,b}	5.535,02 ± 442,73 ^a
Consumo Total (kg)	6.979,91 ± 76,23	8.123,85 ± 78,22	9.714,53 ± 36,51
Sobrevivência (%)	82,34 ± 9,11	76,67 ± 1,63	81,08 ± 11,12
FCA _{med}	1,787 ± 0,02	1,810 ± 0,02	2,09 ± 0,21
Produtividade _{med} (kg.m ⁻²)	4,40 ± 0,07 ^b	5,05 ± 0,04 ^{a,b}	5,27 ± 0,50 ^a

818 Letras diferentes na mesma linha indicam que há diferença significativa entre os tratamentos para o teste de Tukey
819 ($\alpha=0.05$).

820

821 A análise estatística revela que os parâmetros Peso_f, Biomassa_f e Produtividade
822 apresentaram diferença estatisticamente significante ($p < 0,05$). Os pesos finais (peso_f)
823 entre os tratamentos 400 e 500 foram estatisticamente diferentes ao Tratamento 600. Os

824 parâmetros Biomassa final (Biomassa_f) e produtividade apresentam a mesma relação
825 estatísticas. Ou seja, o tratamento 600 não apresentou diferença significativa com o 500;
826 apenas com 400 e este é estatisticamente igual ao 500.

827 É importante ressaltar, para o tratamento 600, que seu desvio padrão é bem
828 superior aos outros. Nesse aspecto, o Coeficiente de Variação (CV) retrata o quão
829 dispersos estavam os dados em relação à média. O CV para biomassa final foi de 8% para
830 o tratamento 600 e, respectivamente, para 400 e 500 os valores foram de 1,35 % e 0,72
831 %. Com relação a produtividade, apesar do aumento do CV isto não foi o suficiente para
832 alterar a interpretação desse indicador. Logo, o resultado mostra que, os valores de
833 Coeficiente de variação indicam baixa dispersão para biomassa e produtividade (Ferreira,
834 2018).

835 Quanto ao consumo de ração, para o tratamento 400 foram fornecidos 6.979,91
836 kg e nos tratamentos seguintes a quantidade ofertada foi 16,40 % e 39,18% superior
837 àquele resultado. Considerando que durante o período experimental, foi ofertado alimento
838 estimando um crescimento de 1,0 g por semana (Yta et al., 2004). A Figura 1, trata-se da
839 taxa de crescimento esperado (TCE), obtida pela diferença entre o crescimento desejado
840 e o crescimento real. Nesse sentido, o gráfico é interpretado da seguinte forma: o eixo
841 horizontal equivale ao crescimento esperado (1,0 g.semana⁻¹); os valores positivos (ou
842 acima do eixo horizontal) significam um ganho acima do desejado; os valores negativos
843 implicam um ganho menor que o esperado. O tratamento T_400 apresenta um
844 comportamento predominantemente cíclico onde uma semana o crescimento é superior
845 ao esperado e na outra é inferior, oscilando 85% a mais do esperado (na nona semana) e
846 perdendo 175% na pior semana (a oitava). O T_500 apresenta dois picos de crescimento
847 superior ao esperado nas semanas 1 e 5 (15% e 105% superior ao esperado) e quedas de
848 rendimento na maioria das semanas (queda máxima de 39%). Contudo, ressalta-se que
849 mesmo com rendimento inferior ao esperado por cinco semanas consecutivas, o resultado
850 de crescimento esperado, no geral, ficou próximo ao valor almejado. Para o tratamento
851 T_600, o comportamento foi parecido ao do T_400, no entanto, a maior queda de
852 desempenho ocorreu na nona semana (queda de 240%) e nas últimas três semanas de
853 cultivo o crescimento ficou abaixo do esperado.

854

855 **Figura 1** – Taxa de crescimento real durante 11 semanas de cultivo de *L. vannamei*
856 cultivado nas densidades de 400 camarões/m² (T_400); 500 camarões/m² (T_500) e 600
857 camarões/m² (T_600).

858
859

860 No geral, os custos relacionados com o dimensionamento de valores fixos, como
861 área e volume, produzem resultados constantes (Tabela 2). Nesse sentido, Mão de Obra
862 (MO) e Mão de Obra Especializada (MOE) seguem essa relação, pois a área de trabalho
863 independente da densidade. O probiótico tem protocolo previamente estabelecido, que
864 indica o quanto deve ser utilizado por área/volume. Portanto, para estes indicadores, os
865 custos não diferem entre os tratamentos.

866 **Tabela 2**– Resultado dos Custos Operacionais Efetivos (COE) de produção por
867 tratamento com gastos de ração; probiótico, cal hidratada, energia elétrica; pós-larvas;
868 mão de obra e mão de obra especializada.

	Tratamento 400	Tratamento 500	Tratamento 600
Ração (U\$\$)	22.614,90	26.321,28	31.475,08
Probiótico (U\$\$)	63,37	63,37	63,37
Cal hidratada (U\$\$)	426,29	430,15	493,42
Energia elétrica (U\$\$)	7.740,04	7.740,04	7.740,04
Pós-larvas (U\$\$)	12.962,45	16.203,06	19.443,67
Mão de Obra (U\$\$)	1.620,31	1.620,31	1.620,31
Mão de Obra Especializada (U\$\$)	4.860,92	4.860,92	4.860,92

869 Taxa de câmbio referente ao março de 2016 U\$\$1 =R\$ 3,703.

870

871 As pós-larvas tiveram um aumento dos custos diretamente ligado com o aumento
872 da densidade, ou seja, em valores percentuais, o incremento do desembolso com pl's é
873 proporcional à densidade.

874 Para cal hidratada, seu uso está atrelado à atividade de microrganismos
875 nitrificantes, já que esses utilizam o composto nos processos biológicos. O aumento do
876 uso de cal hidratada entre o tratamento 400 e 500 foi de 0,94%, mas o tratamento 600, em
877 média teve um aumento de 15,75% em relação aos outros tratamentos.

878 Com respeito a energia elétrica, devido a necessidade de dimensionar o tamanho
879 dos sopradores com relação a exigência do organismo para que este tenha o máximo do

880 seu desempenho zootécnico, foi utilizado como padrão o tratamento 600, ou seja, se o
 881 soprador calculado para esta densidade permitiu que a concentração de oxigênio ficasse
 882 dentro da faixa ideal o mesmo ocorreria para as outras densidades, assim os valores são
 883 os mesmos.

884 A ração foi o custo mais afetado pela alteração das densidades. O tratamento
 885 T_400, apresentou um gasto total de U\$\$ 22.614,90 e os tratamentos T_500 e T_600,
 886 respectivamente, tiveram um aumento comparativo de 16,38% e 39,18%. Esse aumento
 887 significativo pode ser explicado pelo o FCA (o dado expõe o quanto de ração que teve
 888 ofertada para ganho de biomassa). Para atingir um ganho de biomassa de 1,0 kg por
 889 semana foi considerado um FCA de 1,5 que em termos monetários equivale a U\$\$ 1,62
 890 (custo de 1,5 kg de ração).

891 Na Tabela 3, o índice de gasto relativo (IGR) estimado por semana para cada
 892 tratamento. Valores positivos indicam uma redução de custo com ração, isto é,
 893 corresponde a conversões alimentares mais eficientes; valores negativos mostram uma
 894 conversão alimentar ineficiente (valores maiores que 1,5 ou U\$\$ 1,62). O índice de gasto
 895 relativo total demonstrou que o tratamento T_400 seria o único que permitiu poupar gastos
 896 em ração, pois teve um menor IGR estimado (U\$\$ 1,62). Nesse sentido, a média semanal
 897 do IGR indica uma redução U\$\$ 0,004, enquanto o T_600 teve um aumento de U\$\$ 0,29.
 898 Portanto, enquanto o T_400 apresentou um gasto relativo de U\$\$ 1,616 (menor que o
 899 estimado) os T_500 e T_600 apresentaram valores superiores aos estimados (U\$\$ 1,630
 900 e U\$\$ 1,909). No entanto, enquanto o T_500 aumentou 0,87% o T_600 teve um
 901 incremento de 18,13%, o que indica um maior prejuízo econômico por quilo de camarão
 902 produzido.

903

904

905 **Tabela 3** – Índice de gasto relativo semanal apresentado pelos tratamentos experimentais
 906 onde foi estimado um custo médio semanal de U\$\$ 1,62 kg⁻¹ de camarão produzido.
 907 Gasto relativos acima do valor projetado é indicador de prejuízo, caso contrário, há
 908 economia.

Semanas	Tratamento		
	T_400 (U\$\$)	T_500 (U\$\$)	T_600 (U\$\$)
1	0,47	0,23	0,21
2	-0,55	-0,34	-0,03
3	0,68	-0,36	-1,13
4	0,58	0,21	0,97
5	1,05	1,65	-0,05
6	-1,38	0,52	-0,13

7	1,34	-0,13	0,53
8	-2,90	-0,63	1,15
9	1,78	-0,50	-3,89
10	-0,47	-0,31	-0,11
11	-0,57	-0,45	-0,70
Total	0,049	-0,113	-3,176
Média Semanal	0,004	-0,010	-0,289
Gasto relativo (U\$\$. kg^{-1})	1,616	1,630	1,909

909

910 O COE, em relação aos tratamentos 400 500 e 600, apresenta as seguintes
 911 proporções 73,08 %, 71,59 % e 86,13 % em relação a Receita Bruta (Tabela 4). Sendo
 912 que o item ração tem inegavelmente grande influência sobre o custo total de produção.
 913 No tratamento 600, por exemplo, esse insumo representou 47,91% do total dos custos,
 914 enquanto os demais, 44,97% e 45,98%, respectivamente.

915

916 **Tabela 4** – Resultado das variáveis de produção, Custo Operacional Efetivo(COE),
 917 Ração, Energia elétrica, Receita bruta (RB), Relação Renda Bruta/Custo total (RB/CT),
 918 Ponto de nivelamento (PN), Margem Bruta (MB), Lucro financeiros para cada tratamento
 919 por ciclo.

	Tratamento 400	Tratamento 500	Tratamento 600
Produção (kg)	13.412,05	15.585,06	16.605,06
COE (U\$\$)	50.288,29	57.239,14	65.696,81
Ração (U\$\$)	22.614,90	26.321,28	31.475,08
Energia elétrica (U\$\$)	7.740,04	7.740,04	7.740,04
Receita Bruta (U\$\$)	68.803,82	79.951,38	76.217,24
Relação RB/CT	1,37	1,40	1,16
Ponto Nivelamento (kg)	2.614,43	3.038,02	3.617,66
Margem Bruta (%)	36,82	39,68	16,01
Lucro (U\$\$)	18.515,53	22.712,24	10.520,42

920

921 Ao observar a receita, ela variou fortemente devido ao preço de venda e este está
 922 relacionado com peso médio final do camarão. Nesse sentido, o tratamento 600
 923 apresentou o menor peso médio (10,3 g) e, conseqüentemente, o menor preço (U\$\$ 4,59),
 924 enquanto os outros tratamentos, estatisticamente iguais ($p>0,05$), apresentaram os
 925 maiores pesos e preço de venda (U\$\$ 5,13).

926 Com respeito a relação RB/COE, o tratamento 500 teve o melhor resultado na
 927 relação custo/benefício. Para cada real investido na produção, em valores brutos, o retorno
 928 foi de U\$\$ 1,40. O menor resultado foi identificado no tratamento 600 (U\$\$ 1,16).

929 O tratamento 600 resultou no ponto de nivelamento (PN) 3.617,66 kg para cobrir
930 os gastos totais (COE). O tratamento 400 e 500 apresenta a mesma proporção para o
931 resultado de PN. Logo, para custear a produção são necessários 19,49% do volume total
932 produzido e o restante pode ser convertido em sobras financeiras.

933 O lucro no tratamento 600 foi menor, ou seja, há pouco recurso financeiro que
934 possa ser convertido em investimento para melhorar a capacidade produtiva. O maior
935 lucro foi constatado no tratamento 500, U\$\$ 22.712,24. Logo, todos os fatores de
936 produção avaliados são remunerados e o excedente financeiro varia de acordo com a
937 produção.

938 O custo médio por quilograma foi de U\$\$ 3,749 para o tratamento 400 e com
939 aumento da densidade, provocou uma redução do Cmed, mas o aumento indiscriminado
940 sem considerar o aumento dos insumos, que pode ocorrer de forma mais que proporcional,
941 como a alimentação, impactou negativamente o COE e gerou um aumento do Cmed fato
942 evidenciado no T_600.

943

944 **Tabela 5** – Resultados dos indicadores financeiros para cada tratamento para o custo total
945 e os principais custos operacionais (ração e energia) por ciclo.

Descrição	Tratamento_400	Tratamento_500	Tratamento_600
Custo Médio Total (C_{med})	\$ 3,749	\$ 3,673	\$ 3,956
Custo Médio Ração (C_{medr})	\$ 1,686	\$ 1,689	\$ 1,896
Custo Médio Energia (C_{mede})	\$ 0,577	\$ 0,497	\$ 0,466

946

947 Nesse aspecto, feita uma relação entre os insumos que mais impactaram sobre o
948 custo médio de produção, ração e energia corresponderam a 60,36%, 59,51% e 59,71%,
949 respectivamente, tratamento 400, 500 e 600. A decomposição dos custos demonstra uma
950 relação diferente com a densidade, ou seja, à medida que esta aumenta o custo médio com
951 a ração aumentou; contudo, a energia o segue uma relação inversamente proporcional.

952 Quanto a quantificação da sensibilidade das variáveis, possível identificar quais
953 delas mais impactaram sobre o lucro. No caso, Energia, FCA, MOE e Produção são os
954 fatores que mais alteram o lucro. O resultado do incremento percentual sobre cada índice
955 está resumido na Tabela 6. Nas condições analisadas, os resultados indicam que para o
956 tratamento 400 para cada aumento percentual, levaria um aumento de 68,60% na
957 produção. Com relação ao tratamento 600, este ganho percentual gera um aumento de
958 produção de 15,70%.

959

960 **Tabela 6** – Resultado da análise de sensibilidade para os tratamentos 400, 500 e 600
 961 camarões/m² com as variáveis Fator de conversão alimentar (FCA) Energia e Mão de
 962 obra especializada (MOE) que mais impactam sobre o lucro no sistema BFT.

	Tratamento 400	Tratamento 500	Tratamento 600
FCA	-22,50%	-4,92%	-6,56%
Energia	-23,15%	-4,34%	-4,81%
MOE	-14,54%	-2,72%	-3,02%
Produção	68,60%	14,94%	15,79%

963

964 Já em relação a Simulação de Monte de Carlo para os tratamentos 400, 500 e 600
 965 indica que a probabilidade de obter lucro menor que zero é 67,91%, 0,74% e 75,07%,
 966 respectivamente. O Lucro médio obtido através da SMC indica, por meio do Coeficiente
 967 de Variação, alta dispersão dos dados. O Tratamento 500 possui média de lucro positiva
 968 e o resultado de IC indica que valores estão dentro de um intervalo positivo.

969

970 **Tabela 7** – Resultados da análise de risco para Simulação de Monte Carlo com os valores
 971 médios, Intervalo de Confiança (IC) e probabilidade (p) de ocorrência de lucro menor que
 972 zero ($L < 0$) para os dados avaliados.

	Tratamento 400	Tratamento 500	Tratamento 600
Lucro (U\$\$)	-354,74 ± 762,42	1095,09 ± 448,91	-1505,74 ± 2225,37
IC	-416,85 a -292,63	1058,52 a 1131,66	-1687,02 a -1324,46
P ($L < 0$)	67,91%	0,74%	75,07%

973 O Intervalo de Confiança foi elaborado usando a estatística do teste t para uma confiança de ocorrência de
 974 95%.

975

976 Como descrito anteriormente, o aumento da densidade não influenciou diferenças
 977 significativas entre os pesos finais médios ($Peso_f$) dos tratamentos 400 e 500, contudo o
 978 mesmo não ocorre com o tratamento 600. Em vista disto, é notório o quanto os preços de
 979 venda impactando nos resultados financeiros, posto que também não houve diferença
 980 ($p < 0,05$) entre as sobrevivências. O preço de venda para o tratamento 600 foi de U\$\$
 981 4,59, enquanto os tratamentos 400 e 500, que tiveram o mesmo preço, e foram 11,76%
 982 superior ao 600. O tratamento que teve o melhor resultado de RB foi o 500.
 983 Adicionalmente, é o T_500 que há a maior relação custo/benefício, ou seja, o maior
 984 retorno bruto para cada U\$\$ investido. Em contrapartida, o tratamento 600 teve o menor
 985 resultado (U\$\$ 1,16) isto ($RB/CT > 1$).

986 A margem bruta (MB), conhecida também como lucro operacional, mostra o
 987 quanto entrou, em valores líquidos, descontados o COE. O T_500 apresentou o melhor
 988 resultado (39,68%), já o T_600 o menor (16,01 %). A MB trata-se da relação entre RB e
 989 o COE e é indubitável a relação que há com o manejo, visto que, vinculado a este

990 indicador estar o somatório dos custos desembolsados para operacionalizar o sistema.
991 Assim, no curto prazo, além de influenciado pelos preços, o T_600, também foi
992 influenciado pelo tipo de manejo realizado.

993 O ponto de nivelamento mostra o T_500 com o menor valor de produção utilizado
994 para custear o COE (2.614,43 kg). Para o T_600 o resultado corrobora todos os outros
995 indicadores, ou seja, para liquidar o COE é necessária uma parte maior da produção.
996 Contudo, o T_400, T_500 e T_600 o lucro ($L > 0$) indica que além de pagos todos os custos
997 houve geração de riqueza.

998 Com o objetivo de identificar a relação entre o aumento da densidade e os
999 principais custos (Ração e Energia) foi o utilizado o custo médio como parâmetro. Os
1000 Cmed dos tratamentos oscilaram entre U\$\$ 3,673 a U\$\$ 3,956 com o T_500 apresentando
1001 o menor resultado. Contudo, a decomposição do gasto médio, mostra, em relação a
1002 energia, relação inversa, ou seja, o aumento da densidade diluir o custo isso ocorreu
1003 devido a consideração de admitir que o sistema de aeração teria a mesma potência para
1004 todos os tratamentos. Para a alimentação, o valor fica próximo ao encontrado na
1005 estimativa do gasto relativos (tabela 3). Para o T_600 a diferença entre o valor real e o
1006 estimado foi de 0,68% enquanto o maior valor para essa diferença foi identificado no
1007 T_400 (4,15%) os valores reforçam quando o manejo e a ração podem impactar sobre os
1008 sistemas hiperintensivo.

1009 Com relação aos outros fatores produtivos, houve o aumento dos desembolsos.
1010 Nesse caso, o aumento da densidade gerou aumento proporcional no gasto com pós-
1011 larvas. Para a cal hidratada, o aumento do consumo e, conseqüentemente, dos gastos estão
1012 relacionados com o aumento da atividade biológica, o que não ocorre de forma
1013 proporcional.

1014

1015 **4. DISCUSSÃO**

1016 Hanson et al. (2013) afirmam que o sistema BFT demanda alto investimento e
1017 elevado custo de operação, este último podendo tornar-se um entrave no médio e longo
1018 prazo. Portanto, a ênfase na análise do Custo Operacional Efetivo (COE) ocorre devido
1019 ao impacto que este custo representa no Custo Total e na Receita Bruta (RB) e, por
1020 conseqüente, na viabilidade financeira do empreendimento. Rego et al. (2017) por meio
1021 da metodologia de custos definida por Matsunaga et al. (1976), identificaram que o COE
1022 pode alcançar mais de 80% do CT, fato validado por Almeida et al. (2021).

1023 Adicionalmente, Campos (2006) relata que, mesmos em sistemas convencionais, o COE
1024 tem grande impacto sobre o CT.

1025 Hasan et al. (2007) descrevem alimentação como insumo mais caro no processo
1026 produtivo empregado pela carcinicultura. Em se estudo, os resultados dos custos com
1027 ração permitiram alegar que, em média 32% da RB dos tratamentos 400 e 500 são para
1028 custear os desembolsos com este insumo; já no tratamento 600 representou 41,29%. No
1029 entanto, Rego et al. (2017) e Almeida et al. (2021) encontraram valores que
1030 correspondem, respectivamente, a 27,45 e 22,97% da RB; valores menores que os
1031 apresentados nesse estudo. Logo, o aproveitamento e o manejo da ração podem converter-
1032 se em um ponto crítico especialmente referente ao FCA (Hasan e New, 2013).

1033 Assim, incrementar o aproveitamento e, indiretamente, o desempenho de
1034 crescimento pode ser a diferença entre o sucesso ou fracasso na produção aquícola. Nesse
1035 aspecto, para atingir o melhor rendimento no manejo alimentar, alguns protocolos de
1036 alimentação têm sido descritos: a) Jory et al. (2001) e Tacon et al. (2002), consideram a
1037 biomassa total e a temperatura para estimar o alimento; b) Yta et al. (2004), utiliza o
1038 número de organismos, o crescimento e o FCA esperado. Mas, ambos protocolos
1039 apresentam o fator sobrevivência para calcular o alimento a ser ofertado. Como exposto
1040 na Tabela 3, o gasto relativo à ração aumenta, sobretudo, nas últimas semanas do ciclo
1041 produtivo e isto pode estar ligado, também, ao ajuste da ração fato constatado,
1042 especialmente, no tratamento T_600 onde houve um aumento de U\$\$ 0,289 por semana
1043 no custo da ração. Dessa forma, é necessária uma ação conjunta entre manejos e ração de
1044 qualidade.

1045 De acordo com Tacon et al. (2013) a otimização dos manejos alimentares poderia
1046 incrementar a eficiência produtiva da fazenda. Com relação à eficiência da conversão
1047 alimentar, tornar o processo mais eficiente implica em reduzir a quantidade de ração
1048 ofertada para produzir a mesma quantidade ou produzir mais com a mesma quantidade
1049 de ração. Assim, práticas como a adoção de menores intervalos entre alimentações ou a
1050 incorporação de alimentadores automáticos (Reis et al., 2020; Ullman et al., 2019), são
1051 soluções que podem ser consideradas após a avaliação entre custo e benefício. Os manejos
1052 alimentares podem ser adotados para diminuir as perdas mediante a melhora do FCA e
1053 indiretamente o IGR.

1054 O FCA mostra, nas condições as quais o experimento foi realizado, que o aumento
1055 da densidade resultou em uma redução da eficiência alimentar. Isto, provavelmente,
1056 ocorreu no tratamento T_600, pois não só expressou um menor ICE como também foi

acompanhado das alterações mencionadas. Logo, com objetivo de melhorar os parâmetros produtivos e, conseqüentemente, o lucro algumas alternativas devem ser adotadas tais como: o monitoramento do ganho de peso semanal e a utilização de rações específicas para cultivos hiperintensivos (Braga et al., 2016).

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a alta densidade é uma condição de estresse para o animal e como declara Li et al. (2017) em condições de estresse, como em altas densidade de estocagem, pode ser gerar mudança das necessidades nutricionais dos camarões. Os efeitos de altas densidades não só são refletidos no crescimento como também no sistema imune e antioxidante dos organismos (Gao et al., 2017). Adicionalmente, Arnold et al. (2006) descrevem que o camarão *Penaeus esculentus* estocado em altas densidade podem também desenvolver canibalismo. O custo com a energia oscilou entre 9,68% e 11,24%; o tratamento 500 apresentou o menor resultado; e o 400 o maior em relação a participação sobre a RB. Porém, no geral, os valores ainda são superiores aos relatados por Rego et al. (2017) e Almeida et al. (2021); que foram, respectivamente, 2,08% e 4,27% sobre à RB. O dispêndio com eletricidade ocorre, principalmente, devido ao uso contínuo do sistema de aeração e esta demanda uma potência por hectare superior ao exigido pelo sistema convencionais (Hargreaves, 2013). Assim a melhora na eficiência da demanda por energia passa pelo desenvolvimento e utilização de equipamentos que estejam dimensionados corretamente para o sistemaser utilizado , ou uma nova mudança na tecnologia do sistema de aeração (ou seja, com melhores rendimentos). Nesse aspecto Hargreaves (2013), alega que além de manter o oxigênio em concentrações elevadas, a aeração em tanques de BFT, também é utilizada para suspensão os sólidos suspensos.

Em relação aos salários, estes representaram 9,42%; 8,11% e 8,50% da RB. Apesar do amplo conhecimento requerido aos funcionários para operacionalização da tecnologia BFT, este custo teve baixo impacto sobre a receita. Resultados que concordam são relatados por Rego et al. (2017) e Almeida et al. (2021), que encontraram, respectivamente, 2,88 e 4,97%.

Contudo, , deve-se ressaltar alguns paralelos entre o presente estudo e alguns artigos supracitados. Por exemplo, o estudo conduzido por Rego et al. (2017) coletou dados de empreendimento operado com a tecnologia BFT com densidade de estocagem, em média, de 113 camarões.m⁻²; Almeida et al. (2021) utilizou de simulação para demonstrar os resultados financeiros do sistema BFT com densidade de 400 camarões.m⁻². Nesse sentido, FCA entre os trabalhos foi discrepante, Rego et al. (2017), 1,8; e 1,3;

1091 Almeida et al. (2021), contrastou o exposto por Krummenauer et al. (2011) e Silveira et
1092 al. (2020), visto que, as densidades foram similares. Krummenauer et al. (2011)
1093 complementa relatando que a densidade pode gerar impactos negativos sobre os
1094 parâmetros verificados. Em seus estudos, o autor relata que a densidade de 450
1095 camarões.m⁻² não foi beneficiada pela produtividade natural. Já Hargreaves (2013) afirma
1096 que a intensificação da produção pode afetar a contribuição nutricional do floco. Logo, o
1097 sistema hiperintensivo não são afetados positivamente por esta importante relação,
1098 contrastando com a afirmação Wasielesky et al. (2006); atingindo maiores valores de
1099 FCA.

1100 É importante ressaltar que apesar do aumento percentual de 25% e 50% na
1101 biomassa inicial estocada para os tratamentos 500 e 600, em relação ao tratamento 400,
1102 isso não implicou em ganhos proporcionais de biomassa final. Os resultados deste
1103 indicador, mostram que aqueles tratamentos foram, respectivamente, 16,15 e 23,80%
1104 superior ao 400 estes resultados impactaram a RB.

1105 A análise de sensibilidade identificou quais são as vulnerabilidades sobre o lucro.
1106 Nesse caso, para os tratamentos verificados observou-se como fragilidade: FCA, Energia,
1107 MOE e Produção. Sendo que, a proporção de atuação destes fatores sobre o lucro difere,
1108 principalmente, no T_600. Assim, o resultado para este tratamento (600) mostrou-se
1109 sensível as estimções, com impactos sobre o lucro que vão de -6,56% a 15,79%. Tais
1110 resultados são ratificados por Rego et al., (2017b) e Almeida et al. (2021) que concluem
1111 que, apesar da biossegurança, alta produtividade e elevada sobrevivência; o sistema está
1112 sujeito a custo de produção elevado o que gera incertezas.

1113 Com relação a metodologia, Correia Neto, (2019) caracteriza a análise de
1114 sensibilidade como uma ferramenta para identificar os riscos, mas ressalta que esta análise
1115 não considera o efeito das mudanças que uma parâmetros pode causar sobre as demais
1116 variáveis, condição *ceterius paribus*. Nesse aspecto, o aperfeiçoamento sobre
1117 determinado parâmetro caracterizado como impactante (ou sensível) exige conhecimento
1118 amplo para que um a melhora no sistema ocorra.

1119 A Simulação de Monte Carlo (SMC), utilizada para determinar a probabilidade de
1120 o lucro ser negativo, identificou que a pior situação, para os tratamentos simulados foi o
1121 T_600 (75,07 %), este resultado reforça todos os outros resultados financeiros. A
1122 explicação do tratamento 400 (tratamento que também mostrou L<0) ocorre devido ao
1123 Intervalo de Confiança. O IC indicou faixas de valores negativos, logo, ocorre, como

1124 mostra o resultado, uma elevada chance caso o modelo produtivo adote a densidade de
1125 400 e 600, de prejuízo.

1126 Continuando o resultado confirma descrito de Rego et al. (2017a) e Almeida et
1127 al. (2021) que declararam que os indicadores financeiros gerados pelo sistema BFT em
1128 condições de riscos é influenciado pelo alto custo operacional. Almeida et al. (2021)
1129 sugere como medidas para reduzir as incertezas e, conseqüentemente os riscos, a adoção
1130 de manejo otimizados dos ciclos produtivos, isso refletiria em custos menores e tornaria
1131 atividade mais atraente para novos empreendimentos.

1132 Por fim é importante ressaltar o aspecto adotado na elaboração da análise de
1133 incerteza. Os modelos foram determinados sobre os valores médios assim com base no
1134 desvio é possível determinar por meio das interações a probabilidade de ocorrência do
1135 evento desejado ($L < 0$).

1136

1137 **5. CONCLUSÃO**

1138 O tratamento que teve o melhor resultado financeiro para o sistema Hiperintensivo
1139 foi o T_500, sendo que todos os demais se mostraram sujeito a mesma fragilidade, mas a
1140 densidade de 600 camarões.m⁻² apresentou-se mais sensibilidade as variações do FCA,
1141 Energia, MOE e Produção e, conseqüentemente, apresentou maior risco.

1142 Os resultados encontrados revelam a imposição de planejamento prévio, medidas
1143 de controle e correções rotineiras, assim redução da possibilidade de prejuízo financeiro.
1144 Adicionalmente, essas práticas podem auxiliar na racionalização dos gastos e na obtenção
1145 de melhores resultados zootécnicos. No entanto, mesmo resultados zootécnicos elevados,
1146 podem não implicar em bons resultados financeiros. Há, portanto, a necessidade de
1147 conhecer os custos e suas oscilações para identificar e quantificar os riscos.

1148 O estudo aponta que outros fatores estão diretamente relacionados com os
1149 resultados financeiros apresentados e devem ser avaliados individualmente e,
1150 posteriormente, sua atuação conjunta. O Manejo, Condição de estresse e Nutrição são
1151 parâmetros que estão mutuamente relacionados e que necessitam de pesquisa específica.
1152 Em especial, com objetivo de redução do custo ou melhora dos índices zootécnicos.
1153 Ademais, é importante uma avaliação completa, por meio do levantamento de todos os
1154 custos, para constatar se há viabilidade de financeira dos sistemas hiperintensivo.

1155

1156 **REFERÊNCIA**

- 1157 A.G.J. Tacon, J.J. Cody, L.D. Conquest, S. Divakaran, I.P.F.& O.E.D., 2002. Effect of
1158 culture system on the nutrition and growth performance of Pacific white shrimp
1159 *Litopenaeus vannamei* (Effect of culture system on the nutrition and growth
1160 vannamei (Boone) fed different diets. *Aquac. Nutr.* 8, 121–137.
- 1161 Arnold, S.J., Sellars, M.J., Crocos, P.J., Coman, G.J., 2006. An evaluation of stocking
1162 density on the intensive production of juvenile brown tiger shrimp (*Penaeus*
1163 *esculentus*). *Aquaculture* 256, 174–179.
1164 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.01.032>
- 1165 Braga, A., Magalhães, V., Hanson, T., Morris, T.C., Samocha, T.M., 2016. The effects of
1166 feeding commercial feed formulated for semi-intensive systems on *Litopenaeus*
1167 *vannamei* production and its profitability in a hyper-intensive biofloc-dominated
1168 system. *Aquac. Reports* 3, 172–177. <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2016.03.002>
- 1169 Campos, C., 2006. Alternativa econômica para o novo rural do nordeste brasileiro : o
1170 cultivo do camarão *Litopenaeus vannamei*. *GEPEC* 10, 40–53.
- 1171 Correia Neto, J.F., 2019. *Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento*.
- 1172 Da Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Fóes, G.K., Rosas, V.T.,
1173 Wasielesky, W., 2022. The effect of partial harvest on production and growth
1174 performance of *Litopenaeus vannamei* reared in biofloc technologic system.
1175 *Aquaculture* 546. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737408>
- 1176 da Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Rosas, V.T., Wasielesky, W., 2020.
1177 Hyperintensive stocking densities for *Litopenaeus vannamei* grow-out in biofloc
1178 technology culture system. *J. World Aquac. Soc.* 51, 1290–1300.
1179 <https://doi.org/10.1111/jwas.12718>
- 1180 de Almeida, M.S., Carrijo-Mauad, J.R., Gimenes, R.M.T., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S.,
1181 Poersch, L.H., Wasielesky, W., Fóes, G.K., 2021. Bioeconomic analysis of the
1182 production of marine shrimp in greenhouses using the biofloc technology system.
1183 *Aquac. Int.* 29, 723–741. <https://doi.org/10.1007/s10499-021-00653-1>
- 1184 de Yta, A.G., Rouse, D.B., Davis, D.A., 2004. Influence of nursery period on the growth
1185 and survival of *Litopenaeus vannamei* under pond production conditions. *J. World*
1186 *Aquac. Soc.* 35, 357–365. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2004.tb00099.x>
- 1187 Emerenciano, M.G.C., Martínez-Córdova, L.R., Martínez-Porchas, M., Miranda-Baeza,
1188 A., 2017. Biofloc Technology (BFT): A Tool for Water Quality Management in

1189 Aquaculture. Water Qual. <https://doi.org/10.5772/66416>

1190 Ferreira, P.V., 2018. Estatística Experimental Aplicada às Ciências Agrárias, 630.2195.

1191 ed, 2018. 2018, Viçosa.

1192 Hanson, T., Ph, D., Morris, T., 2013. Economic Analyses Project Rising Returns For

1193 Intensive Biofloc Shrimp Systems. Glob. Aquac. Advocate 2011–2013.

1194 Hargreaves, J.A., 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture. SRAC Publ. 1–12.

1195 Hasan, M.R., Hecht, T., De Silva, S.S., Tacon, A.G.J., 2007. Study and analysis of feeds

1196 and fertilizers for sustainable aquaculture development, FAO. Fisheries Technical

1197 Paper.

1198 Hasan, M.R., New, M.B., 2013. On-farm feeding and feed management in aquaculture.

1199 FAO Fish. Aquac. Tech. Pap. No. 583. Rome, FAO. 407–431.

1200 Jory, D.E., Cabrera, T.R., Dugger, D.M., Fegan, D., Lee, P.G., Lawrence, L., Jackson,

1201 C.J., Mcintosh, R.P., Castañeda, J., International, B., Park, H.A., Hwy, N.O.D.,

1202 Pierce, F., 2001. a Global Review of Shrimp Feed Management: Status and

1203 Perspectives. Aquaculture 104–152.

1204 Krummenauer, D., Peixoto, S., Cavalli, R.O., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2011.

1205 Superintensive culture of white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in a biofloc

1206 technology system in Southern Brazil at different stocking densities. J. World

1207 Aquac. Soc. 42, 726–733. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2011.00507.x>

1208 Li, E., Wang, X., Chen, K., Xu, C., Qin, J.G., Chen, L., 2017. Physiological change and

1209 nutritional requirement of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei* at low

1210 salinity. Rev. Aquac. 9, 57–75. <https://doi.org/10.1111/raq.12104>

1211 Martin, N.B., Serra, R., Oliveira, M.D.M., Ângelo, J.A., Okawa, H., 1998. Sistema

1212 integrado de custos agropecuários - CUSTAGRI. Informações Econômicas v. 28,

1213 n.1 28, 7–28.

1214 Matsunaga, M., Bemelmans, P.F., Toledo, P.E.N., Dulley, R.D., Okawa, H., Pedroso,

1215 I.A., 1976. Metodologia de custo de produção utilizada pelo IEA.

1216 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017a. Financial viability of inserting

1217 the biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* farm: a case study

1218 in the state of Pernambuco, Brazil. Aquac. Int. 25, 473–483.

1219 <https://doi.org/10.1007/s10499-016-0044-7>

1220 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017b. Risk analysis of the insertion

1221 of biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* production in a farm

1222 in Pernambuco, Brazil: A case study. Aquaculture 469, 67–71.

1223 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.12.006>

1224 Reis, J., Novriadi, R., Swanepoel, A., Jingping, G., Rhodes, M., Davis, D.A., 2020.

1225 Optimizing feed automation: improving timer-feeders and on demand systems in

1226 semi-intensive pond culture of shrimp *Litopenaeus vannamei*. *Aquaculture* 519,

1227 734759. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734759>

1228 Rezende, F.P., Mataveli, M., 2017. Impactos da mancha branca nos custos de produção

1229 do camarão no Nordeste. *Ativos da Aquicultura* 3, 6–7.

1230 Rocha, I., 2022. Os desafios para a superação dos atuais entraves confrontados pela

1231 carcinicultura brasileira. *Rev. da ABCC – Assoc. Bras. Criadores Camarão* 4–5.

1232 Santo, G. J.; Marion, J. C.; Segatti, S., 2002. *Administração de custo na agropecuária.pdf*,

1233 3rd ed. Editora Atlas, São Paulo.

1234 Tacon, A.G., Jory, D., Nunes, A., 2013. Shrimp feed management: issues and

1235 perspectives. *On-farm Feed. Feed Manag. Aquac.* 481–488.

1236 Ullman, C., Rhodes, M.A., Allen Davis, D., 2019. Feed management and the use of

1237 automatic feeders in the pond production of Pacific white shrimp *Litopenaeus*

1238 *vannamei*. *Aquaculture* 498, 44–49.

1239 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.08.040>

1240 Valenti, W.C., Barros, H.P., Moraes-Valenti, P., Bueno, G.W., Cavalli, R.O., 2021.

1241 *Aquaculture in Brazil: past, present and future. Aquac. Reports* 19, 100611.

1242 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>

1243 Varian, H.R., 2015. *Microeconomia: uma abordagem moderna, Analytical Chemistry.*

1244 Wasielesky, W., Atwood, H., Stokes, A., Browdy, C.L., 2006. Effect of natural

1245 production in a zero exchange suspended microbial floc based super-intensive

1246 culture system for white shrimp *Litopenaeus vannamei*. *Aquaculture* 258, 396–403.

1247 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.04.030>

1248 Yang Gao, Zhuliu He, Hector Vector, Bo Zhao, Zhiwei Li, Jie He, Jeong-Yeol Lee, Z.C.,

1249 2017. Effect of Stocking Density on Growth, Oxidative Stress and HSP 70 of Pacific

1250 White Shrimp *Litopenaeus vannamei* Yang. *Turkish J. Fish. Aquat. Sci.* 17, 51–60.

1251 <https://doi.org/10.4194/1303-2712-v17>

1252

1253

1254

1255

1256

1257 **CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA BFT PARA**
1258 **DIFERENTES ESTRATÉGIAS EM REGIME HIPERINTENSIVO COM**
1259 **DESPESCA PARCIAL**

1260

1261 Autores: Fellipy Augusto Holanda Chaves¹; Lucas Genésio Pereira da Silveira¹, Marcos
1262 Almeida²; Kilmer Coelho Campos³; Wilson Wasielesky Jr.¹; Luís Henrique Poersch¹.

1263 Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Instituto de Oceanografia, Universidade
1264 592 Federal do Rio Grande - FURG; Rua do Hotel, n°2, Cassino, Rio Grande, RS, Brazil.
1265 593 CEP: 96210-030.

1266 ²Programa de Pós-graduação em Agronegócios. Universidade Federal da Grande
1267 Dourados (PPGA-UFGD), Unidade II: Rodovia Dourados/Itahum, km 12, Cidade
1268 Universitária, Dourados/MS. CEP: 79804-970.

1269 ³Programa de Pós-graduação em Economia Rural, Departamento de Economia Agrícola,
1270 Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 2977-
1271 Campus do Pici, Bloco 826. Fortaleza-Ceará, Brasil. CEP:60440-970.

1272 Autor por correspondência: Universidade Federal do Rio Grande (PPGAq-IO-FURG),
1273 Rua do Hotel n° 2, Cassino, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96210-030 E-
1274 mail: fellipychaves@gmail.com (Fellipy A.H. Chaves).

1275

1276 **RESUMO**

1277 A produção com a tecnologia de bioflocos (BFT) já demonstrou sua alta capacidade
1278 produtiva. Contudo, o BFT carece de informação que correlacione a produtividade do
1279 sistema com os custos de produção e o retorno financeiro-econômico. O objetivo desse
1280 estudo é avaliar o resultado de viabilidade econômica do sistema BFT que adote a
1281 estratégia de despesa parcial. Para isso, utilizou-se o sistema de formação de custos por
1282 meio do COE, OCO e COT; receita e os indicadores Valor Presente Líquido (VPL), Taxa
1283 Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM), Payback (PPB),
1284 Índice de Lucratividade (IL), Margem Bruta (MB) e Ponto de Equilíbrio (PE). A avaliação
1285 foi feita adotando um modelo com despesa total (DT); com uma despesa parcial (D_1);
1286 duas despesa parciais (D_2) e quatro despesa parciais (D_4). Os resultados indicam que
1287 o sistema com uma despesa parcial obteve os piores resultados econômicos. Em
1288 oposição, a estratégia D_2 teve os melhores resultados, indicando que o emprego de duas
1289 despesas parciais sejam economicamente mais viáveis/adequados.

1290 **Palavras-chaves:** Estratégias alternativas, camarão marinho, hiperintensivo, avaliação
1291 econômica

1292 Artigo Submetido: Revista de Economia e Agronegócio

1293 1. INTRODUÇÃO

1294 a produção aquícola global apresentou uma taxa de crescimento de 31.38%;
1295 enquanto, a pesca teve uma retração 0.77% A análise dos grupos produzidos pela
1296 aquicultura acentua ainda mais a estagnação da atividade rativista. Por exemplo, os
1297 crustáceos apresentaram uma produção duas vezes maior que os capturados (FAO,2022).

1298 Especificamente, o camarão marinho, *Litopenaeus vannamei*, representa 51.7%
1299 de todo os crustáceos produzidos, além de ter volume produção superior aos capturados
1300 (FAO, 2022). Características como rápido crescimento, possibilidade de adensamento,
1301 necessidade de ração com baixo teor de proteína e um pacote tecnológico consolidado
1302 possibilitaram a rápida expansão e disseminação desta espécie (FELIX et al., 2020).

1303 No Brasil, a espécie se adaptou bem ao cultivo em viveiros, especialmente na
1304 região Nordeste, porém já é possível encontrar produções de *L. vannamei* em todas as
1305 regiões do país com o emprego de diversos sistemas produtivos, sendo o sistema semi-
1306 intensivo o mais utilizado (Valenti et al., 2021). Contudo, a intensificação da produção e,
1307 consequentemente, a maior demanda por alimento, aliadas as altas taxas de renovação de
1308 água passaram a impactar negativamente o sistema convencional de produção
1309 (Hargreaves, 2006).

1310 Particularmente, a prática de renovação de água com o objetivo de eliminar
1311 compostos que podem ser prejudiciais ao cultivo, tornou-se a principal via de entrada de
1312 agentes patogênicos no ambiente de produção (Lightner, 2005). As doenças prejudicaram
1313 a produção em sistema de cultivo convencionais causando perdas produtiva e prejuízos
1314 financeiros (Nunes e Feijó, 2016; Rezende e Mataveli, 2017). Em razão disso,
1315 pesquisadores, com o intuito de reduzir os impactos ambientais causados pelas altas taxas
1316 de renovação de água, lançamentos de efluente e necessidade de aumentar a
1317 biossegurança passaram a desenvolver um sistema com zero ou reduzida trocas de água,
1318 denominado tecnologia de bioflocos (BFT).

1319 O sistema BFT tem características que o diferem de outros sistemas, tais como:
1320 controle dos compostos nitrogenados no próprio sistema de cultivo (Crab et al., 2007);
1321 aproveitamento da biomassa microbiana como suplementação alimentar (Wasielesky et

1322 al., 2006); e alta capacidade produtiva retratada por meio dos indicadores zootécnicos de
1323 sobrevivência e produtividade (Krummenauer et al., 2011 e Silveira et al., 2020).

1324 Apesar das vantagens relacionadas ao sistema BFT, o entrave fica a cargo do alto
1325 valor de investimento e operação (Hanson et al., 2013; Hargreaves, 2013). Como citado
1326 anteriormente, estudos relacionados com as formas de produzir e aos manejos que devem
1327 ser adotados já foram elaborados. Estratégias de produção já estão definidas com
1328 densidade variadas (Krummenauer et al., 2011; Silveira et al., 2020) e estratificação do
1329 período de despesca (Silveira et al., 2022), mas existem poucos estudos que relacionem
1330 estratégias produtivas e retornos financeiros.

1331 Nesse sentido, a análise financeira é uma ferramenta adequada por considerar o
1332 valor de investimento, os custos de produção (saídas) e receitas geradas pelo projeto
1333 (entradas) ao longo de um determinado horizonte de tempo. Assim, avaliar as estratégias
1334 produtivas por meio do fluxo de caixa e indicadores economicos auxilia na identificação
1335 dos pontos que podem ser um entrave na produção e tomada de decisão (Bordeaux-Rêgo,
1336 2013; Correia Neto, 2019).

1337 Poersch et al. (2012), por exemplo, ao avaliarem o retorno econômico do sistema
1338 BFT, sugerem que entre as estratégias produtivas, a adoção da técnica de despesca parcial
1339 pode ser uma alternativa na busca por melhorar os resultados financeiros do
1340 empreendimento já que é possibilita aumentar o número de entrada em caixa e alcançar
1341 preço de venda melhor e, consequentemente alavanca a receita do empreendimento.
1342 Adicionalmente, a despesca parcial atua no incremento dos resultados zootécnicos
1343 (Silveira et al., 2022). Em vista disso, o objetivo é avaliar financeiramente o sistema BFT
1344 em condição de produção hiperintensiva por meio de diferentes estratégias de despesca
1345 parcial, bem como, o efeito sobre o crescimento .

1346 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

1347 Os resultados produtivos para o sistema BFT com despescas parciais (D's) e sem
1348 despescas parciais (DT) do camarão marinho, *L. vannamei*, foram obtidos de ciclos de
1349 produção realizados em tanques em escala comercial (tanques de 35 m²) na Estação
1350 Marinha de Aquicultura, Universidade Federal de Rio Grande-FURG, Brasil.

1351 As estratégias de produção adotaram a densidade de 500 camarões/m². O ciclo de
1352 produção durou 22 semanas, assim, por ano, foi estimado a realização de dois ciclos. As
1353 estratégias foram divididas em: despesca total (DT); uma despesca parcial e final (D_1);
1354 duas despesca parciais e final (D_2) e quatro despesca parciais e final (D_4). A primeira

1355 despesa parcial ocorreu na 14ª semana de cultivo, nesse período, todos tanques (D_1;
 1356 D_2; D_4) foram despescados, porém em proporções diferentes. Foram despescados
 1357 50%, 33% e 20% da produção esperada, respectivamente, para D_1, D_2 e D_4. A
 1358 segunda despesca ocorreu na 16ª semana, porém apenas para o D_4; retirou-se mais 20%
 1359 da produção; na 18ª semana foi realizada a despesca do D_2 e D_4, foram retirados,
 1360 respectivamente, 33% e 20%; na 20ª semana foi despescado mais 20% do D_4; e na 22ª
 1361 semana todos os tanques com as diferentes estratégias produtivas (DT; D_1; D_2; D_4)
 1362 foram totalmente despescados (Tabela 1).

1363

1364 **Tabela 1** – O ciclo de despesca entre as diferentes estratégias de despescas parciais do
 1365 camarão marinho *L. vannamei* ao longo do ciclo de produção de 22 semanas. A primeira
 1366 despesca começa a ocorrer na 14ª semana. Despesca total (DT); uma despesca parcial
 1367 (D_1); duas despescas parciais (D_2) e quatro despescas parciais (D_4).

1368

1369 A oferta de ração foi determinada segundo a metodologia proposta por de Yta et
 1370 al. (2004) sendo que o cálculo da alimentação foi em relação a expectativa de crescimento
 1371 semanal (1.0 g por semana), Fator de Conversão Alimentar (FCA: 1.4:1), número de
 1372 indivíduos estocados por unidade produtiva e a expectativa de mortalidade de 11% ao
 1373 final do ciclo.

1374

$$1375 \quad OR = (N * FCA * EC * S) / 7$$

1376

1377 A área total de cultivo de 6000 m² (0,6 ha) foi estimada para 10 unidades de
 1378 produção os tanques confeccionados em madeiras, cobertos com mantas de PEAD de 1.0
 1379 mm e com rede hidráulica e elétrica. O sistema de aeração, configurado de acordo com
 1380 Hargreaves (2013), foi formado por difusores de ar com mangueira microperfurada e
 1381 alimentado por soprador de ar (blower) e aeradores de pás.

1382 Com relação ao levantamento financeiro, os custos de implantação e de operação
 1383 seguiram as metodologias propostas por Bordeaux-Rêgo (2013), Correia Neto (2019) e
 1384 Martin et al. (1998), sendo os custos são formados por Custo Operacional Efetivo (COE);
 1385 Outros Custos Operacionais (OCO) e Custo Operacional Total (COT). Para isso Martin

1386 et al. (1998) descrevem o COE como o custo desembolsado com a produção aquícola, ou
1387 seja, a compra de ração, pós-larvas, energia, mão de obra (permanente, temporária e
1388 especializada), alcalinizantes (cal hidratada), melação e probiótico comercial.

1389 O OCO é a soma dos encargos (2.70% relativo a Contribuição Especial
1390 Seguridade Social Rural, CESSR) e impostos (35.97%, relativos a 8.0 % do FGTS;
1391 11.11% férias e prêmio do FGTS; 2.50% salário família, educação e INCRA). O cálculo
1392 da depreciação seguiu o proposto por Correia Neto (2019) feito por meio do método
1393 linear. Por último o COT, correspondeu a soma do COE com o OCO e a receita é o
1394 produto do preço de venda pela biomassa total produzida (Martin et al., 1998; Matsunaga
1395 et al., 1976).

1396 A análise financeira, realizada após o levantamento dos dados da etapa anterior,
1397 foi realizada por meio do fluxo de caixa projetado para um horizonte de tempo de 10 anos.
1398 Quanto a avaliação econômica, levou-se em consideração as seguintes técnicas de análise
1399 de investimento: valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), taxa interna
1400 de retorno modificada (TIRM), payback descontado (PBD) e índice de lucratividade (IL).
1401 No entanto, para o cálculo dos indicadores foi necessário escolher a taxa mínima de
1402 atratividade (TMA), para isso optou-se pelo valor da Taxa Selic de 13.75% referente ao
1403 ano de 2022. A escolha pela Taxa Selic ocorre por esta indexar o Título do Tesouro Selic,
1404 uma aplicação vista como de baixo risco.

1405 O VPL utilizou os valores futuros estimados pelo projeto ajustados à TMA ao
1406 período de referencia para tomada de decisão (Correia Neto, 2019), ou seja, no ano zero.
1407 Adicionalmente, Bordeaux-Rêgo (2013) afirma que como critério de decisão, o VPL
1408 positivo indica recuperação do capital investido à TMA escolhida e geração de riqueza.

1409

1410
$$VPL = \sum_{n=1}^t \frac{VP_n}{(1+i)^n}$$

1411

1412 A TIR, que representa o potencial de retorno do projeto em termos percentuais, é
1413 utilizada de forma análoga à TMA. O resultado encontrado indica se o projeto poderá ser
1414 aceito (TIR>TMA) ou rejeitado (Correia Neto, 2019).

1415

1416
$$0 = \sum_{n=1}^t \frac{VP_n}{(1+TIR)^n}$$

1417

1418 A TIRM reflete o retorno esperado de forma mais realista por levar em conta as
1419 diferentes taxas de reaplicação dos valores gerados.

1420

1421
$$TIRM = \sqrt[n]{\frac{VF}{VP}} - 1$$

1422

1423 O PBD corresponde ao de retorno do investimento, descrito em anos, com relação
1424 ao custo do capital (Correia Neto, 2019).

1425 O IL é a relação entre os valores futuros gerados pelo projeto e o investimento; o
1426 resultado, caso seja positivo e maior que 1 ($IL > 1$), além do retorno gerado há o incremento
1427 de riqueza (Bordeaux-Rêgo, 2013).

1428

1429
$$IL = \frac{\sum VP}{I}$$

1430

1431 Para relacionar produção, custo e lucro utilizou-se o ponto de equilíbrio (PE).
1432 Logo, por meio desta medida é possível identificar o nível mínimo de produção, em
1433 quilograma, para custear o COT, ou seja, a partir de qual valor o COT será igual a Receita.
1434 O PE é a relação entre o COT e o preço de venda por quilograma (P_u) de camarão
1435 produzido (Martin et al., 1998).

1436

1437
$$PE = \frac{(COT)}{P_u}$$

1438

1439 O lucro operacional (LO) agrega consigo o reflexo do custo operacional sobre a
1440 receita, além disso, este indicador identifica simultaneamente o efeito do COE sobre a
1441 viabilidade do sistema produtivo no curto prazo e as sobras para cobrir os COT (Martin
1442 et al., 1998).

1443

1444
$$LO = RB - COE$$

1445

1446 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

1447 Entre os maiores desembolsos para implantação do sistema BFT em regime
 1448 hiperintensivo destacam-se, estrutura de produção, edificações e aeração; estes itens
 1449 juntos representam 88.63% do valor investido (Tabela 2).

1450 A estrutura de produção inclui gastos com arcos galvanizados, o plástico de
 1451 revestimento, madeiras para a construção dos tanques, a geomembrana (1.0 mm) para
 1452 recobrir a estrutura de madeira, tubulação utilizada no sistema de aeração (alimentados
 1453 por três sopradores de 7.5 HP), mangueira microperfurada e o sistema hidráulico.

1454

1455 **Tabela 2** - Descrição dos principais valores de investimento para implantação e
 1456 operacionalização do sistema produtivo bioflocos para cultivo do camarão marinho,
 1457 *Litopenaeus vannamei*, em densidade hiperintensivo (500 cam/m²) em uma área de
 1458 6000m².

	Qtde	Valor Unitário	Total	%
Aquisição de terreno (ha?)	02	US\$ 4,140.71	\$ 8,281.42	2.94%
Estrutura de Produção	10	\$ 17,282.70	\$ 172,826.97	61.26%
Aeração			\$ 36,677.99	13.00%
<i>Compressor de radial</i>	03	\$ 1,727.86	\$ 5,183.58	
<i>Aeradores de pás</i>	40	\$ 787.36	\$ 31,494.41	
Edificações	01	\$ 40,525.25	\$ 40,525.25	14.37%
Equipamentos de qualidade de água	01	\$ 3,337.64	\$ 3,337.64	1.18%
Equipamentos de pescas	01	\$ 1,668.81	\$ 1,668.81	0.59%
Geradores	01	\$ 17,218.91	\$ 17,218.91	6.10%
Bomba d'água	01	\$ 1,564.76	\$ 1,564.76	0.55%
Total			\$ 282,101.75	100%

1459 Cotação do Dólar: R\$ 5.45 (24/08/2021).

1460

1461 Os custos com insumos variaram (para as diferentes estratégias empregadas) de \$
 1462 390,300.62 a \$ 455,621.81; o menor valor de custo operacional efetivo (COE) foi
 1463 encontrado com duas pescas parciais (D_2, \$390,900.62) e o maior valor quando se
 1464 realizou pesca total (DT, \$ 455,621.81). A ração foi o item com maior impacto sobre
 1465 o COE, independente do tratamento. Em seguida, foi mão de obra; e, posteriormente,
 1466 energia, pós-larvas (Gráfico 1). O gasto com ração entre os tratamentos variou de 69.56%
 1467 a 74.84%, sendo que menor e o maior valor foram encontrados, em D_4 e DT,
 1468 respectivamente.

1469 A mão de obra, esta é constituída por pessoas da gerência, técnicos de campos e
 1470 mão de obra temporária. Ademais, os gastos com mão de obra, pós-larvas, energia elétrica

1471 e outros insumos não apresentaram grandes diferenças entre as estratégias de produção
1472 avaliadas.

1473

1474 **Gráfico 1** - Representação dos principais custos de produção (pós-larvas, ração, energia,
1475 mão de obra, outros insumos*), em valores percentuais, para operação em sistema BFT
1476 em condição hiperintensivo.

1477

1478 *Outros insumos: alcalinizantes, melão, farelos e probióticos.

1479

1480 Foi possível observar que a partir da décima sexta semana de cultivo o DT inicia
1481 a estabilização do crescimento, atingindo o peso médio final de 13.72g. Nas demais
1482 estratégias de manejo os animais continuaram a crescer e a si diferenciar de DT. Ao final
1483 do ciclo, o D_1, D_2 e D_4 encerraram com peso médio, respectivamente, de 18.93g;
1484 18.43g e 19.74g (Gráfico 2).

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496 **Gráfico 2** - Crescimento semanal dos camarões ao longo do ciclo de produção de 22
1497 semanas empregando o manejo de despescas parciais. O eixo horizontal é período de
1498 acompanhamento semanal de crescimento dos animais e o eixo vertical são pesos (em
1499 grama) relativo à semana.

1500

1501

1502 O comportamento em relação a taxa de crescimento real dos animais ao longo do
1503 ciclo descrito no Gráfico 3, expõe que os animais apresentaram crescimento (Gráfico 2),
1504 porém este ocorreu a uma taxa inferior ao esperado. Entre a terceira e a quarta semana
1505 ocorreram as maiores quedas na taxa de crescimento (D_2; com -29.49%); já entre a
1506 quarta e a décima semana o declínio da taxa de crescimento aparenta uma estabilização
1507 com D_2 apresentando a maior queda; (-35.53%); porém, a partir da décima semana os
1508 valores de taxa de crescimento iniciaram o processo de retomada de melhora nos
1509 resultados. As estratégias D_1 e D_4, a partir da décima sétima semana, apresentaram
1510 resultados de taxas de crescimentos superiores aos resultados esperados. Isso ocorreu por
1511 conta das despescas parciais, em D_1 foi despesado 50% do volume estimado de
1512 produção e D_4, entre décima e a décima quarta semana, foi despesa duas vezes. Em
1513 cada despesa foi retirado 20% da produção estimada.

1514 Já D_2 conseguiu superar o valor de crescimento esperado a partir da décima nona
1515 semana, período em que já havia sido realizada as duas despescas parciais. Quando ao
1516 DT, a dificuldade de mensurar a mortalidade ao longo do ciclo e de ajustar corretamente
1517 a sobrevivência prejudicaram o resultado obtido pelo modelo de produção.

1518

1519

1520

1521

1522 **Gráfico 3** - Taxa de crescimento real (em termos percentuais) ao longo das 22 duas
 1523 semanas de cultivos. O eixo horizontal indica as semanas de cultivos; eixo vertical retrata
 1524 a variação de crescimento observado em relação ao valor esperado.

1525
 1526

1527 Entre DT e D_1 (uma despesa parcial) ocorreu um incremento da produção de
 1528 67.94%; já D_1 e D_2 o aumento foi de 6,26%; e entre DT e D_2 o aumento da produção
 1529 foi de 78.46%; a exceção ficou por conta do D_4 que em relação ao D_2 apresentou uma
 1530 queda na produção de 1.36% (Tabela 3).

1531

1532 **Tabela 3** – Resultados das diferentes estratégias produtivas em relação aos valores de
 1533 produção, preço médio de venda por peso (de acordo com a gramatura) no momento da
 1534 ocorrência das despesas do cultivo do camarão marinho *L. vannamei* sob regime
 1535 hiperintensivo de produção.

	DT	D_1		D_2			D_4				
Produção (kg)	48,930.61	82,176.18		87,321.71			86,135.51				
Preço (US\$/g)	6.61	5.50	7.12	5.50	6.24	7.16	5.50	5.87	6.42	6.97	7.33
Despesa (semana)	22	14	22	14	18	22	14	16	18	20	22

1536

1537 Em relação a variação dos preços de vendas, as estratégias com emprego de
 1538 despesas parciais favoreceram o ganho de pesos dos animais possibilitando assim a
 1539 obtenção de melhores valores na comercialização. Já a estratégia DT obteve apenas um
 1540 preço de venda. Entre os métodos de despesas parciais, D_4 apresentou o maior preço e
 1541 peso de venda; o DT apresentou o menor peso (13.72g) e preço de venda (\$6.61). É
 1542 importante destacar que a relação entre os valores médios dos diferentes preços de vendas
 1543 obtidos para as estratégias de despesas parciais identificou que a diferença entre o menor
 1544 valor (\$6.30) e maior (\$6.42) foi de 1.91%.

1545 A melhor produção (D_2) refletiu também sobre a melhor receita (\$ 553,871.72).
 1546 DT foi fortemente impactada pela baixa produção e, conseqüentemente, menor receita (\$

1547 323,187.66) e em relação a D_1 (\$524,623.37) a queda da receita foi de 62.38%. Assim,
 1548 o lucro operacional (LO) apresentou valores que variam entre \$ -189,526.34 a \$
 1549 100,250.44; o D_2 apresentou o melhor resultado (Tabela 4).

1550

1551 **Tabela 4** – Resultado das diferentes estratégias produtivas em relação aos valores
 1552 financeiros para a geração de Receita, Custo Operacionais Efetivos (COE), Custo
 1553 Operacional Total (COT), Lucro Operacional (LO), Ponto de Equilíbrio por quilograma
 1554 produzido.

	DT	D_1	D_2	D_4
Produção	48,930.61	82,176.18	87,321.71	86,135.51
Receita (U\$\$)	323,187.66	524,623.37	553,871.72	552,030.65
COE(U\$\$)	455,621.81	403,219.27	390,300.62	402,619.83
COT(U\$\$)	512,714.00	465,750.22	453,621.28	465,890.78
Lucro Operacional (US\$)	-189,526.34	58,873.15	100,250.44	86,139.87
Ponto de Equilíbrio (kg)	77,624.90	75,776.87	73,438.14	73,389.92
Ponto de Equilíbrio (%)	158.64	92.21	84.10	85.20
COT/kg (U\$\$/kg)	10.48	5.67	5.19	5.41
COE/kg (U\$\$/kg)	9.31	4.91	4.47	4.67

1555

1556 O modelo de produção com despesa total (DT) apresentou o maior resultado de
 1557 ponto de equilíbrio (PE) 77,624.90 kg, ou seja, para custear o COT é necessário aumentar
 1558 a produção em 158.64%. O D_2 teve o menor valor para PE, logo, para cobrir o COT é
 1559 necessário utilizar 84.10% da produção. Entre as estratégias analisadas, o custo médio de
 1560 DT apresentou os maiores resultados (COT\$ 10.48 e COE \$ 9.31) e o menor para COT e
 1561 COE foram obtidos em por D_2 (\$ 5.19 e \$4.47).

1562 Os indicadores econômicos revelaram a viabilidade econômica da estratégia de
 1563 duas despesas parciais (D_2) durante ciclo produtivo. Esta técnica alcançou o maior
 1564 valor de VPL (\$ 245,958.36), TIR (17.43%), TIRM (15.02) para uma taxa mínima de
 1565 atratividade (TMA) de 13.75%. Adicionalmente, o IL (1.87) foi superior no tratamento
 1566 D_2 com Payback descontado de quatro anos para o retorno do capital investido.

1567 Entre os métodos de produção utilizado, o DT apresentou os piores resultados com
 1568 VPL (-1,456,754.83), IL (-4.16); não foi possível encontrar o resultado de TIR. Quando
 1569 ao PPB descontado, no horizonte de tempo previsto do projeto (10 anos), não apresenta
 1570 resultado.

1571 O D_4 alcançou um resultado positivo para o VPL, além disso o IL foi o segundo
 1572 maior resultado entre os modelos de produção. O resultado do PBD foi de cinco anos. Foi
 1573 a estratégia que apresentou o segundo maior valor de TIR, porém o resultado foi inferior a
 1574 TMA (13.75%). Esta relação de inferioridade da TIR com a TMA é observada também

1575 em D_1, apesar dos valores positivos de VPL (28,007.22), TIR (2.18%), MTIR (9.06%),
1576 IL (1.10), além disso, o PBD indica que o retorno do capital investido ocorreria em 9
1577 anos.

1578

1579 **Tabela 5** – Resultados dos indicadores econômicos Valor Presente líquido (VPL), Taxa
1580 Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR), Índice de
1581 Lucratividade (IL), Payback descontado (PPB) para um fluxo de caixa de 10 anos com a
1582 realização de dois ciclos de produção por ano.

	DT	D_1	D_2	D_4
VPL (US\$)	-1,280,414.54	28,007.22	245,958.36	171,632.17
TIR (%)	-	2.18%	17.43%	12.47%
MTIR (%)	-100%	9.06%	15.02%	13.29%
IL	-4.16	1.10	1.87	1.61
PPB Descontado (anos)	-	9.00	4.00	5.00

1583

1584 Estudos como os de Silveira et al. (2020), Silveira et al. (2022) e Krummenauer
1585 et al. (2011) relatam a elevada capacidade produtiva do sistema BFT. Contudo, Hanson
1586 et al. (2013) e Hargreaves (2013) destacam que este sistema necessita de equipamentos
1587 que garantam a manutenção dos parâmetros físico-químico e biológicos dentro da faixa
1588 ideal para o desenvolvimento das espécies cultivadas. Os autores ressaltam ainda que isto
1589 é responsável pelo alto investimento em instalação e equipamento e que esse fato pode se
1590 tornar um entrave para entrada de novos investidores e expansão do sistema.

1591 Os valores de implantação (fortemente influenciados pelos gastos com a estrutura
1592 de produção) evidenciados no presente estudo corroboram os resultados encontrados por
1593 Rego et al. (2017). Contudo, os autores ressaltam que o empreendimento aquícola que
1594 passa a operar no sistema BFT e que necessita apenas adaptar a unidade produtiva
1595 apresenta como maior desembolso a aquisição e instalação da geomembrana que
1596 representa 31% do custo de adequação do empreendimento.

1597 Já a necessidade de aeração constante torna estes equipamentos essenciais no
1598 processo produtivo (Hargreaves, 2013). O valor do investimento em bombas e aeradores
1599 apresentados nestes estudos é ratificado por Rego et al. (2017), onde esses itens
1600 representaram cerca de 13% dos custos totais de implantação. Contudo, vale salientar a
1601 importância do dimensionamento adequado da aeração, visto que, a relação entre potência
1602 e eficiência dos sopradores apresenta relação positiva (ou seja, maior potência implica
1603 em maior eficiência na incorporação de oxigênio na água), além disso, estes sopradores
1604 apresentam menor custo por unidade de potência. Adicionalmente, no sistema BFT, o

1605 papel da energia elétrica está ligado diretamente a aeração. Nesse aspecto, Mauladani et
1606 al. (2020) destacam que o investimento em um sistema de aeração eficiente pode melhorar
1607 os resultados índices zootécnicos e os resultados financeiros da produção. No entanto, o
1608 dimensionamento inadequado gera o aumento do valor de investimento e do custo
1609 operacional refletido no gasto com energia.

1610 Quando aos custos de operação, Santos (2002) esclarece que, independentemente
1611 do resultado de produção, conhecer os principais insumos ou os que mais impactam sobre
1612 custo de produção, favorece a criação de um sistema de custos confiável que poderá ser
1613 utilizado no planejamento, organização e controle da unidade produtiva. Nesse sentido, o
1614 custo identificado, no presente estudo, assim como outros autores (Almeida et al., 2021;
1615 Rego et al., 2017) ração, energia elétrica, e mão de obra são os custos que mais impactam
1616 sobre a operacionalização do sistema BFT correspondendo aproximadamente a 92 a 93%
1617 do valor total do COE.

1618 Os custos com alimentação entre as diferentes estratégias variaram entre 69.56%
1619 e 74.84% no COE. Estes resultados caracterizam a influência da eficiência da conversão
1620 alimentar dos animais em alta densidade. O gráfico 3, evidencia que a expectativa de
1621 crescimento semanal (1.0 g) não foi alcançada durante a decima oitava (18^o) semana,
1622 refletindo no aumento do custo com alimentação e, conseqüentemente no COE. Almeida
1623 et al. (2021) relataram valores que estão dentro dos limites estabelecidos nesse estudo.
1624 Na avaliação feita por Rego et al. (2017), a ração apresentou resultado menor (37,89% do
1625 COE) ao encontrado neste estudo, este resultado está relacionado com a densidade de
1626 estocagem adotada (113 camarões.m⁻²) e, principalmente com o custo médio do
1627 quilograma gasto com alimentação U\$\$ 0,90 contra U\$\$ 1,69, encontrado neste estudo.
1628 A avaliação realizada por Almeida et al. (2021) ocorreu na mesma região da realização
1629 deste estudo o que justifica os valores próximos dos gastos com alimentação, porém a
1630 pesquisa realizada por Rego et al. (2017), ocorreu na região Nordeste (maior centro
1631 produtor de camarão marinho do Brasil) onde estão concentradas a maior parte das
1632 fábricas de ração do país. Hargreaves (2013) complementa ao afirmar que o processo de
1633 intensificação da produção por meio do aumento da densidade causa uma maior
1634 dependência por alimento artificial já que o papel nutricional do flocos passar a ser menor.
1635 Adicionalmente, Hanson et al. (2013) descrevem que rações formuladas especificamente
1636 para atender as exigências nutricionais dos cultivos de camarões marinhos em sistema de
1637 BFT contribuem com melhores resultados econômicos principalmente pela redução dos

1638 custos de produção (melhorou a conversão alimentar) e, conseqüentemente, a melhora
1639 dos indicadores econômico-financeiros.

1640 Com relação ao custo com energia elétrica entre as estratégias analisadas, a
1641 variação ficou entre 9.17% e 10.71% do valor total do COE. A necessidade de aeração
1642 contínua implica na utilização constante de energia que impacta diretamente sobre o COE.
1643 O resultado de energia, relatado por Rego et al. (2017) e Almeida et al. (2021), são aos
1644 maiores gasto com energia.

1645 Particularmente, sobre o efeito da mão de obra é interessante relatar o consenso
1646 entre autores, mesmo para diferentes regiões e países, quanto a experiência e nível
1647 educacional para funcionários que operam diretamente o sistema de produção. Islam et
1648 al. (2014) e Monteiro et al. (2019) avaliaram a produção de camarão na Malásia e na
1649 região Nordeste do Brasil (Ceará e Rio grande do Norte) e verificaram que há uma relação
1650 positiva entre educação e experiência profissional com os resultados alcançados com
1651 produção. Nesse sentido, investir em capacitação ou na contratação de profissionais
1652 experientes pode ser uma importante ferramenta para redução dos custos e/ou aumento
1653 da produção. Contudo, o incremento do número de despesas refletiu em maior custo com
1654 mão de obra temporária, o que causou um aumento nos custos de produção.

1655 O COE e o COT apresentaram uma queda com o incremento do número de
1656 despesas DT a D_2 de 14.66% e 11.52%, respectivamente; porém, em D_4 há um
1657 aumento em relação a D_2 devido ao maior gasto com ração e mão de obra. Em relação
1658 ao COE e COT por quilograma produzido, o maior resultado foi constatado em DT
1659 101,93% maior que D_2.

1660 Com relação a análise dos indicadores, Martin et al. (1998) esclarecem que a
1661 função do lucro operacional (LO) é avaliar a viabilidade financeira do empreendimento
1662 no curto prazo. Este estudo identificou que, com exceção de DT, as estratégias adotadas,
1663 no curto prazo, apresentaram retorno para custear pelo menos o COE. E, ao realizar uma
1664 análise entre os modelos de produção, é possível verificar que D_2 apresentou o LO,
1665 aproximadamente, duas vezes maior que o D_1, evidenciando o impacto do COE e da
1666 produção com aumento de 6.26% sobre a sua lucratividade.

1667 Santos et al. (2002) descreveram o ponto de equilíbrio (PE) como o mínimo que
1668 o empreendimento deve produzir para cobrir todos os custos. Nesse estudo, os valores
1669 encontrados mostram que, para custear o COT, é necessário utilizar de 84.10% (para D_2)
1670 a 92.21% (D_1). No estudo de caso realizado por Rego et al. (2017) que comparou o
1671 sistema BFT com o convencional o valor de produção mínimo do sistema BFT para pagar

1672 o COT ficou em 72.47%; já para o convencional 45.78%. É importante destacar que o
1673 autor avaliou um sistema de biofloco com densidade quatro vezes menor ao deste estudo
1674 e como afirma Hargreaves (2013) o aumento da densidade implica em menor efeito da
1675 produtividade primária como fonte de alimento. Adicionalmente, Ostrensky et al. (2017)
1676 relata que sistemas convencionais buscam a maior participação do alimento natural para
1677 reduzir os custos e tornar os produtores mais competitivos.

1678 Martin et al. (1998) e Santos (2002) ressaltaram que não há uma relação ideal
1679 entre percentual (ou quantidade) mínima de produção para custear o COT, porém relatam
1680 que a viabilidade financeira da empresa, no longo prazo, está atrelada, entre outras coisas,
1681 a eficiência produtiva, novos investimentos e a formação de reserva financeira. Logo,
1682 quanto maior for o valor do PE menor serão as sobras financeiras que poderão ser
1683 alocadas para estas atividades.

1684 Bordeaux-Rêgo (2013) e Correia Neto (2009) avaliaram o valor presente líquido
1685 (VPL) como indicador de decisão para execução de projeto de investimento. Nesse
1686 aspecto, a adoção do sistema BFT com despesa total (DT) mostrou-se inviável por gerar
1687 um VPL negativo. Segundo os autores anteriormente citado, VPL mede a capacidade de
1688 rentabilidade, logo o DT não há geração de riqueza e o critério de aceitação da TMA não
1689 é atendido. O estudo realizado por Almeida et al. (2021) e Rego et al. (2017) que
1690 trabalharam com densidades de 400 e 113 camarões.m⁻², respectivamente, apresentaram
1691 geração de riqueza (VPL>0) e superação das TMA's propostas. Em DT, fica evidente o
1692 quanto do custo de produção e a valor de produção podem impactar sobre os indicadores
1693 econômicos.

1694 A taxa interna de retorno (TIR) identificou que apenas o D_2 foi capaz de gerar
1695 retorno acima da TMA. Correia Neto (2009) relata TIR >TMA indica que a remuneração
1696 do capital investido é superior a taxa de referência, nesse sentido, D_1 e D_4 mostram
1697 resultados que os caracterizam como inviáveis, pois não remuneraram o capital investido.
1698 Almeida et al. (2021), identificam o sistema BFT como economicamente viável, o mesmo
1699 resultado foi constatado por Rego et al. (2017), porém este último, ao compara os
1700 resultados entre sistema BFT e o sistema convencional conclui que o sistema
1701 convencional apresenta TIR superior ao BFT.

1702 Quanto ao payback (PBD), assim como na TIR, o melhor resultado foi encontrado
1703 com duas despesas parciais. Os resultados encontrados por Rego et al. (2017)
1704 corroboram com os encontrados no presente estudo. Contudo, Almeida et al. (2021)

1705 relataram que o tempo médio do retorno do capital investido ocorreria em dois anos e 10
1706 meses, o resultado está relacionado ao preço de venda.

1707 Os resultados econômicos deste estudo apresentam algumas divergências com os
1708 resultados encontrados nos trabalhos econômico-financeiros descritos por Almeida et al.
1709 (2021) e Rego et al. (2017). Inicialmente, neste estudo a receita (definida pela relação
1710 entre quantidade produzida e preço por gramatura) foi influenciada pelos diversos preços
1711 de venda (o menor preço foi do camarão de 10g com \$ 5,50 e o maior preço foi 7.33 para
1712 o de 20g). Já Almeida et al. (2021) relataram que o preço de venda do camarão 12g foi
1713 de \$ 7.30; nesse estudo, o camarão só atingiu o valor superior a \$7.00 a partir de 18g. Por
1714 sua vez Rego et al. (2017) ao realizarem a avaliação no estado de Pernambuco (localizado
1715 na região NE, onde estão os maiores produtores de camarão do Brasil) identificaram preço
1716 mais competitivo (\$ 5.91 para o camarão 12g) valor próximo ao obtido quando foi
1717 realizada a segunda despesa de D_4 (\$ 5.87 quando o camarão estava com o mesmo peso
1718 12g).

1719 A taxa de câmbio também é um fator que evidencia as diferenças entre os
1720 resultados. Rego et al. (2017) e Almeida et al. (2021) relatam, respectivamente, que os
1721 preços médios de venda da ração foi de \$ 1.63/kg e 1.29/kg, porém com taxa de câmbios
1722 diferentes. Por último é importante frisar que a alta do custo de produção e preço de venda
1723 podem afetar os resultados de lucratividade do empreendimento (Rego et al., 2017a).

1724 Ressalta-se ainda há margem significativa para melhora dos resultados
1725 econômicos. Nesse sentido, um estudo detalhado sobre o local de instalação é o primeiro
1726 passo para redução tanto dos custos de instalação (investimento) como de operação, isso
1727 em função da variação de preço para compra de insumos e da venda do produto. Com
1728 relação ao sistema, o manejo alimentar eficiente poderá incrementar positivamente os
1729 resultados econômicos. Adicionalmente, pós-larvas com crescimento rápido e rações
1730 específicas para sistemas superintensivos podem reduzir o tempo de cultivo, melhorar a
1731 conversão a alimentar e, conseqüentemente, melhorar a rentabilidade do
1732 empreendimento.

1733 4. CONCLUSÃO

1734 O cultivo de camarão em regime hiperintensivo com a tecnologia de bioflocos
1735 apresentou rentabilidade sob a condição de duas despesas parciais (D_2). É importante,
1736 destacar que o custo operacional e a margem de lucratividade podem melhorar para tornar

1737 a atividade mais atrativa do ponto de vista econômico, já que, o sistema apresenta margem
1738 para melhora dos resultados financeiro-econômicos.

1739 Salienta-se que no processo da escolha do local para instalação do
1740 empreendimento deve ser considerado os fornecedores e mercado para venda da
1741 produção, bem como, os preços de venda, pois são fatores que podem afetar (de forma
1742 positiva ou negativa) rentabilidade do empreendimento.

1743 Com relação aos regimes de despesas mesmo não havendo diferenças
1744 significativas em termos de produção o aumento do número de despesas de forma não
1745 planejada mesmo que favoreça o aumento do preço de venda em vista do ganho de peso
1746 aumenta também gasto com outros custos o que pode não compensar financeiramente
1747 essa estratégia.

1748 Por último, a alimentação é outra fonte de atenção no processo produtivo. Nesse
1749 sentido, devido a maior dependência que o sistema hiperintensivo demanda por ração, o
1750 ideal é escolher alimentos de qualidade e, especificamente, para atender as exigências
1751 desse tipo de sistema produtivo.

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769 **REFERÊNCIA**

- 1770 Bordeaux-Rêgo, R. et al, 2013. Viabilidade econômico-financeira de projetos, 4^o. ed. Rio
1771 de Janeiro.
- 1772 Correia Neto, J.F., 2019. Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento.
- 1773 Crab, R., Avnimelech, Y., Defoirdt, T., Bossier, P., Verstraete, W., 2007. Nitrogen
1774 removal techniques in aquaculture for a sustainable production. *Aquaculture* 270, 1–
1775 14. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.05.006>
- 1776 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Fóes, G.K., Rosas, V.T., Wasielesky,
1777 W., 2022. The effect of partial harvest on production and growth performance of
1778 *Litopenaeus vannamei* reared in biofloc technologic system. *Aquaculture* 546.
1779 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737408>
- 1780 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Rosas, V.T., Wasielesky, W., 2020.
1781 Hyperintensive stocking densities for *Litopenaeus vannamei* grow-out in biofloc
1782 technology culture system. *J. World Aquac. Soc.* 51, 1290–1300.
1783 <https://doi.org/10.1111/jwas.12718>
- 1784 Almeida, M.S., Carrijo-Mauad, J.R., Gimenes, R.M.T., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S.,
1785 Poersch, L.H., Wasielesky, W., Fóes, G.K., 2021. Bioeconomic analysis of the
1786 production of marine shrimp in greenhouses using the biofloc technology system.
1787 *Aquac. Int.* 29, 723–741. <https://doi.org/10.1007/s10499-021-00653-1>
- 1788 Yta, A.G., Rouse, D.B., Davis, D.A., 2004. Influence of nursery period on the growth and
1789 survival of *Litopenaeus vannamei* under pond production conditions. *J. World*
1790 *Aquac. Soc.* 35, 357–365. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2004.tb00099.x>
- 1791 FAO, 2022. World Fisheries and Aquaculture, FAO:Rome,2022.
- 1792 Felix, Samocha, Menaga, 2020. Vannamei Shrimp Farming, Vannamei Shrimp Farming.
1793 CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003083276>
- 1794 Hanson, T., Ph, D., Morris, T., 2013. Economic Analyses Project Rising Returns For
1795 Intensive Biofloc Shrimp Systems. *Glob. Aquac. Advocate* 2011–2013.
- 1796 Hargreaves, John A, 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture Southern
1797 regional aquaculture center. *SRAC Publ.* 1–12.
- 1798 Hargreaves, J.A., 2006. Photosynthetic suspended-growth systems in aquaculture. *Aquac.*
1799 *Eng.* 34, 344–363. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.009>
- 1800 Islam, G.M.N., Yew, T.S., Noh, K.M., 2014. Technical Efficiency Analysis of Shrimp
1801 Farming in Peninsular Malaysia: A Stochastic Frontier Production Function
1802 Approach. *Trends Appl. Sci. Res.* <https://doi.org/10.3923/tasr.2014.103.112>
- 1803 Krummenauer, D., Peixoto, S., Cavalli, R.O., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2011.
1804 Superintensive culture of white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in a biofloc
1805 technology system in Southern Brazil at different stocking densities. *J. World*
1806 *Aquac. Soc.* 42, 726–733. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2011.00507.x>

- 1807 Lightner, D. V., 2005. Biosecurity in shrimp farming: Pathogen exclusion through use of
1808 SPF stock and routine surveillance. *J. World Aquac. Soc.* 36, 229–248.
1809 <https://doi.org/10.1111/J.1749-7345.2005.TB00328.X>
- 1810 Martin, N.B., Serra, R., Oliveira, M.D.M., Ângelo, J.A., Okawa, H., 1998. Sistema
1811 integrado de custos agropecuários - CUSTAGRI. *Informações Econômicas* v. 28,
1812 n.1 28, 7–28.
- 1813 Matsunaga, M., Bemelmans, P.F., Toledo, P.E.N., Dulley, R.D., Okawa, H., Pedroso,
1814 I.A., 1976. Metodologia de custo de produção utilizada pelo IEA.
- 1815 Mauladani, S., Rahmawati, A.I., Absirin, M.F., Saputra, R.N., Pratama, A.F.,
1816 Hidayatullah, A., Dwiarto, A., Syarif, A., Junaedi, H., Cahyadi, D., Saputra, H.K.H.,
1817 Prabowo, W.T., Kartamiharja, U.K.A., Noviyanto, A., Rochman, N.T., 2020.
1818 Economic feasibility study of *Litopenaeus vannamei* shrimp farming: nanobubble
1819 investment in increasing harvest productivity. *J. Akuakultur Indones.* 19, 30–38.
1820 <https://doi.org/10.19027/jai.19.1.30-38>
- 1821 Monteiro, J.V., Norões, A.K.M., Araújo, R.C.P. de, Araújo, J.A., Silva, F.P. da, 2019.
1822 Metafronteira de produção e eficiência técnica da carcinicultura nos estados do
1823 Ceará e Rio Grande do Norte. *Rev. Econ. e Sociol. Rural* 57, 530–544.
1824 <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.179534>
- 1825 Nunes, A.J.P., Feijó, R.G., 2016. Convivência com o vírus da mancha branca no cultivo
1826 de camarão marinho no Brasil. *Rev. da ABCC* 30–36.
- 1827 Ostrensky, A., Pont, D.J.S.G.D., Cozer, G.G.C.-W.M.V.F.G.N., Silva, R.F. de A.G.-M.U.
1828 de A.T. da, 2017. a Produção Integrada Na Carcinicultura Brasileira Volume I.
1829 Curitiba.
- 1830 Poersch, L.H., Almeida, M., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S., Fóes, G.K., Wasielesky Jr.,
1831 W., 2012. Bioflocos: Uma alternativa viável para produtores de camarão em
1832 viveiros. *Panor. da Aquicultura* 1–6.
- 1833 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017a. Financial viability of inserting
1834 the biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* farm: a case study
1835 in the state of Pernambuco, Brazil. *Aquac. Int.* 25, 473–483.
1836 <https://doi.org/10.1007/s10499-016-0044-7>
- 1837 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017b. Risk analysis of the insertion
1838 of biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* production in a farm
1839 in Pernambuco, Brazil: A case study. *Aquaculture* 469, 67–71.
1840 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.12.006>
- 1841 Rezende, F.P., Mataveli, M., 2017. Impactos da mancha branca nos custos de produção
1842 do camarão no Nordeste. *Ativos da Aquicultura* 3, 6–7.
- 1843 Santo, G. J.; Marion, J. C.; Segatti, S., 2002. Administração de custo na agropecuária.pdf,
1844 3rd ed. Editora Atlas, São Paulo.
- 1845 Valenti, W.C., Barros, H.P., Moraes-Valenti, P., Bueno, G.W., Cavalli, R.O., 2021.
1846 *Aquaculture in Brazil: past, present and future. Aquac. Reports* 19, 100611.

1847 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>

1848 Wasielesky, W., Atwood, H., Stokes, A., Browdy, C.L., 2006. Effect of natural
1849 production in a zero exchange suspended microbial floc based super-intensive
1850 culture system for white shrimp *Litopenaeus vannamei*. Aquaculture 258, 396–403.
1851 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.04.030>

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878 **CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO DOS DIFERENTES**
1879 **SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO CAMARÃO MARINHO**

1880 *Litopenaeus vannamei*

1881

1882 Autores: Fellipy Augusto Holanda Chaves¹; Kilmer Coelho Campos²; Geraldo Kipper
1883 Fóes¹; Wilson Wasielesky Jr.¹; Luis Henrique Poersch¹

1884 Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Instituto de Oceanografia, Universidade
1885 592 Federal do Rio Grande - FURG; Rua do Hotel, n°2, Cassino, Rio Grande, RS, Brazil.
1886 593 CEP: 96210-030.

1887 ²Programa de Pós-graduação em Economia Rural, Departamento de Economia Agrícola,
1888 Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 2977-
1889 Campus do Pici, Bloco 826. Fortaleza-Ceará, Brasil. CEP:60440-970.

1890 Autor por correspondência: Universidade Federal do Rio Grande (PPGAq-IO-FURG),
1891 Rua do Hotel n° 02, Cassino, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96210-030 E-
1892 mail: fellipychaves@gmail.com (Fellipy A.H. Chaves).

1893

1894 **RESUMO**

1895 A produção de camarões realizada no continente está em processo de expansão em função
1896 das inovações dos métodos de produção. Neste sentido, os novos sistemas de produção
1897 têm grande impacto no incremento de produtivos dos últimos anos. Sistemas que inovam
1898 proporcionando ganho exponencial de produtividade e biossegurança, como por exemplo
1899 a tecnologia dos bioflocos ou sistema integrado multitrófico (IMTA) que trabalha com
1900 espécies de níveis tróficos diferentes, onde o resíduo gerado por uma espécie é
1901 aproveitado por outra. Ainda, há também a possibilidade de integrar sistemas diferentes
1902 com o intuito de melhorar os resultados zootécnicos. Entretanto, independente do sistema,
1903 as informações financeiras e econômicas normalmente são escassas. Objetivo deste
1904 trabalho é analisar os diferentes sistemas de produção por meio das atuais estratégias
1905 propostas em diversos estudos e em cultivos realizados em escala comercial. Os dados
1906 relativos aos gastos com implantação foram coletados por meio de entrevistas. As
1907 informações dos resultados zootécnicos para os cultivos em sistema BFT, sistema misto
1908 e IMTA foram retiradas de cultivos realizados em escala comercial. Os resultados
1909 demonstram que nas condições adotadas, o sistema misto que integra o BFT (na fase de
1910 berçários) e o sistema tradicional (na fase de engorda) apresentou os melhores resultados

1911 para os VPL (U\$\$2,328,454.74) TIR (110.47%) e MTIR (31.60%) e para o tempo de
1912 retorno do capital investido (dois anos). No entanto, empreendimentos com sistema BFT
1913 apresentaram os melhores resultados de produtividade. Além disso, os valores
1914 encontrados para os indicadores de rentabilidade forma superiores ao critério de decisão.
1915 Por último, o sistema IMTA demonstra que ainda há margem para melhora dos
1916 indicadores econômicos com ajustes no planejamento e do processo produtivo.

1917

1918 **Palavras-chave:** Camarão, métodos de produção, viabilidade econômica

1919 Artigo Submetido no Boletim do Instituto de Pesca

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944 **INTRODUÇÃO**

1945 Os relatórios emitidos pela FAO (2022) relatam a ascensão da produção de
1946 crustáceos mundialmente. Entre os anos de 2016 e 2020, o crescimento global foi de
1947 42,93%. Paralelamente, entres os crustáceos cultivados em sistemas aquícolas o
1948 *Litopenaeus vannamei*, é responsável 51,7% da produção total (FAO, 2022).

1949 No Brasil, essa espécie exótica mostrou rápida adaptação a condição de produção
1950 local. No entanto, no que se refere a competitividade produtiva entre os países, mesmo
1951 com a disponibilidade de área e água, que favorecem a produção de camarão e adaptação
1952 da espécie (Ostrensky et al., 2017) o setor produtivo ainda não despontou. Fato
1953 comprovado pela observância da maior produção ocorrida em 2003 com 90 mil toneladas
1954 (ABCC/MPA, 2013) . Valenti et al. (2021) caracterizam a produção brasileira de camarão
1955 em monocultivo semi-intensivo ocorrendo, principalmente, na região nordeste do país e
1956 caracterizado por pequenos produtores que operam com baixo nível tecnológico.
1957 Contudo, ao longo dos anos, alguns pontos negativos do cultivo tradicional estão postos
1958 em debate, tais como: questões ambientais, sustentabilidade (Abreu et al., 2011; Queiroz
1959 et al., 2013) e doenças (Ha et al., 2012).

1960 Em contrapartida, nos últimos anos houve o desenvolvimento de diversas
1961 tecnologias produtivas cuja finalidade vai desde aumentar a produtividade, melhorar a
1962 biossegurança do sistema, reduzir e/ou eliminar de resíduos, reduzir e/ou eliminar o
1963 lançamento de efluente e aproveitar os resíduos de uma espécie para o cultivo de outra
1964 espécie. Nesse sentido, o sistema de produção que emprega a tecnologia de bioflocos tem
1965 mostrado sucesso no aumento da produtividade (Silveira et al., 2022), redução do volume
1966 de recurso hídrico necessário no processo produtivo, além de maior biossegurança
1967 (Samocha, 2019). Segundo Hargreaves (2013) e Krummenauer et al. (2011) este sistema
1968 produtivo permite trabalhar com altas densidades de estocagem, com elevado ganho de
1969 produtividade e o uso eficiente da área. Almeida et al. (2021) afirmam que a utilização
1970 mais eficiente dos recursos também caracteriza um ponto positivo. Sendo assim, essa
1971 tecnologia tem sido vista como um sistema mais otimizado, visto que, busca minimizar a
1972 utilização dos insumos para a maximização da produção. Contudo, os itens: elevado valor
1973 de investimento inicial, o emprego de tecnologia, mão de obra qualificada e ração de
1974 qualidade podem dificultar a entrada de investidores e, conseqüentemente, o surgimento
1975 de novos empreendimentos (Hanson et al., 2013; Hargreaves, 2013; Rego et al., 2017a).

1976 Chopin et al. (2001) ao sugerirem um novo tipo de sistema de cultivo, descrevem
1977 a necessidade de integração entre espécies de níveis tróficos diferentes, aproveitando os
1978 resíduos gerados ao longo do processo de produção. Assim o resíduo de uma espécie
1979 poderia ser utilizado por outra como insumo. Os autores ainda destacam que no processo
1980 de integração pode haver melhor aproveitamento do espaço com ganho de produtividade.

1981 No Brasil, há poucos relatos do cultivo multitrófico em escala comercial. Contudo,
1982 Valenti et al. (2021) afirmam que o primeiro passo para o surgimento de novos
1983 empreendimentos deve ser por meio do aumento de linhas específicas de pesquisa. Nesse
1984 sentido, no que diz respeito a ação governamental, a Resolução 413 de 2009 emitida pelo
1985 Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) relata que ao adotar um sistema
1986 integrado com espécies diferentes, comprovada redução do lançamento de efluentes,
1987 melhor biossegurança e otimização do uso de recurso o licenciamento ambiental será por
1988 meio do enquadramento como de menor potencial.

1989 A respeito das espécies utilizadas no processo de integração, Poli et al. (2019)
1990 destacam que ao integrar o cultivo do *L. vannamei* com a tilápia do Nilo (*Oreochromis*
1991 *niloticus*) observou que não houve interferência negativa, mas ganho de biomassa com a
1992 associação. Patarra (2019) descreve o sucesso do cultivo integrado com macroalgas
1993 marinhas. Adicionalmente, Holanda et al. (2020) demonstraram que é possível cultivar
1994 *Mugil liza* (tainha) e *L. vannamei* em sistema de bioflocos para reduzir a quantidade de
1995 sólidos suspensos totais (SST). No entanto, segundo os autores, novas pesquisas devem
1996 ser conduzidas, principalmente, sobre a viabilidade econômica do sistema.

1997 Como exposto acima uma forma de produzir então seria a de considerar a
1998 integração entre sistemas. Em cultivos tradicionais os insumos utilizados são
1999 majoritariamente os mesmos de qualquer outro sistema sendo possível, portanto, a criação
2000 de um sistema misto com a integração do método produtivo tradicional associado a
2001 produção em BFT. Os processos de produção apresentariam como principal diferença a
2002 intensificação do uso dos insumos. Nesse sentido, é tecnicamente viável produzir
2003 utilizando sistemas diferentes num mesmo local. Assim, devido ao alto valor de
2004 implantação do sistema de BFT comparado ao sistema tradicionais (Hanson et al., 2013;
2005 Rego et al., 2017a) sugere-se a adoção do sistema misto. Este sistema contaria com
2006 berçário utilizando a tecnologia de BFT que permite maior densidade de estocagem,
2007 melhorando a capacidade produtiva por área e na fase de crescimento os animais
2008 passariam para o método tradicional aproveitando o alimento natural disponível.

2009 Com toda informação técnica disponível para os diferentes sistemas de produção,
2010 há diversos fatores que são apontados como limitantes da atividade aquícola, como:
2011 carência de mão de obra especializada e falhas na implantação do projeto (Campos, 2006).
2012 Em relação a viabilidade do empreendimento, Campos (2006) e Rego et al. (2017)
2013 ressaltam que há poucas informações sobre rentabilidade da atividade bem como sobre
2014 os custos operacionais, dificultando a entrada e a instalação de novos empreendimentos.
2015 Nesse sentido, é importante destacar, que independente do sistema empregado,
2016 sempre haverá necessidade de avaliação, seja dos custos de implantação ou dos custos
2017 operacionais. Logo, por meio dessas avaliações os produtores poderão identificar quais
2018 os pontos que demandam maiores investimentos e propor alternativas (Martin et al.,
2019 1998). Além disso, a ferramenta de avaliação econômico-financeira é um importante
2020 instrumento que auxilia na tomada de decisão, por exemplo, Martin et al. (1998) alegam
2021 que os produtores, que trabalham com produtos que são classificados com *commodity*,
2022 são tomadores de preço e necessitam estar constantemente avaliando suas ações e seus
2023 métodos produtivos. Assim, o objetivo deste artigo é avaliar e fornecer informações acerca
2024 do investimento necessário nos novos sistemas produtivos e os elementos que causam os
2025 maiores impactos.

2026 **METODOLOGIA**

2027 **Aspectos gerais**

2028 Este estudo avaliou o investimento e os resultados financeiros-econômicos para a
2029 instalação e o funcionamento de projetos aquícolas destinados a produção do camarão *L.*
2030 *vannamei* com a adoção dos sistemas de produção: misto (berçário BFT e engorda semi-
2031 intensiva), superintensivo (tecnologia de bioflocos, BFT) e produção integrada do
2032 camarão marinho com a tilápia (*Oreochromis niloticus*) em sistema Multitrófico.

2033 As informações econômicas são referentes ao ano de 2017 a 2021 e atualizados
2034 para 2022. Os dados foram coletados nas regiões Nordeste (Ceará e Bahia) e Sul (Paraná).
2035 Os dados de origem primária foram coletados por meio de entrevistas junto a produtores
2036 e técnicos. Contudo, quanto ao sistema multitrófico, devido a pouca informação
2037 econômica, optou-se em utilizar aquelas contidas em bibliografia científica para
2038 dimensionar as estruturas e, conseqüentemente, por meio do levantamento de preço, o custo
2039 médio de instalação.

2040 Ressalta-se ainda que na literatura científica, dados referentes aos novos sistemas
2041 de produção são de conhecimento amplo, porém com relação aos resultados reais sejam

2042 de custo de operação e/ou valor de implantação são escassos. Assim, o presente estudo
2043 utilizou dados de implantação de sistema reais para simular a mudança de modelo
2044 produtivo caso os produtores adotassem algum dos sistemas de produção sugeridos.

2045 Todos os sistemas possuem aeração por sopradores (5.0 CV e 7.5CV), mangueira
2046 rugosa (Aerotube ®) e aeradores do tipo pá (2.0 CV). Quando a especificidade relativa a
2047 cada sistema, no modelo misto o uso de sopradores e mangueira rugosa ocorre apenas no
2048 berçário, assim como para o modelo IMTA. No sistema BFT o uso de mangueira
2049 microperfurada e sopradores ocorre em todas as fases (berçário e crescimento). Contudo,
2050 na etapa de crescimento é utilizado sopradores e aeradores com o objetivo de produzir
2051 uma movimentação vertical e horizontal da água. Já no IMTA e no modelo misto na fase
2052 de crescimento a aeração é formada por aeradores.

2053 **Caracterização dos sistemas analisados**

2054 ***Misto***

2055 O sistema misto possui área de 18 hectares de lâmina d'água, cada viveiro com
2056 1.0 hectare e equipado com aeradores (2.0 CV). Em média, para cada hectare, foram
2057 utilizados quatro aeradores ligados somente no período noturno. O berçário foi construído
2058 em concreto com sistema de aeração formado por mangueira microperfurada (rugosa) e
2059 sopradores de ar (5.0 CV).

2060 No viveiro adotou-se o modelo de produção semi-intensivo. No berçário, optou-
2061 se por operar com a tecnologia de bioflocos, com densidade média de 2,000 pl.m⁻³. A
2062 fertilização do berçário foi realizada durante três dias seguidos e buscou manter constante
2063 a relação C: N para otimizar o crescimento da comunidade microbiana. A pós-larvas
2064 foram estocadas no estágio de pl₁₀ (ou seja, 10 dias após o início do estágio de pós-larvas).
2065 O ciclo de produção está dividido em 30 dias no berçário, e 80 dias nos viveiros de
2066 engorda (Tabela 1).Superintensivo

2067 No modelo superintensivo o gasto com implantação foi estimado para uma área
2068 produtiva de 1.0 hectare de lâmina d'água com todo o ciclo produção funcionando
2069 exclusivamente com a tecnologia de BFT. O berçário foi dimensionado para uma
2070 densidade de 2,000 pl.m⁻³. As pós-larvas foram adquiridas quando atingiram o estágio de
2071 pl₁₀ e permaneceram no berçário por 30 dias. O sistema de aeração do berçário era
2072 constituído de mangueira microperfurada e sopradores de 7.5 CV. Na fase de engorda a
2073 densidade final foi estimada para 275 camarões.m⁻². O sistema de aeração é formado por

2074 aeradores associados com mangueiras microporosa e sopradores. O ciclo de produção
2075 total é de 120 dias.

2076 ***Multitrófico***

2077 No sistema multitrófico o organismo principal, assim como nos anteriores, foi o
2078 *L. vannamei*, que foi cultivado em viveiros na forma semi-intensiva com aeração mantida
2079 por aeradores. A área de produção total foi de 5.0 hectare e 1.0 hectare para bacia de
2080 sedimentação. Na bacia de sedimentação foram utilizados peixes da espécie *Oreochromis*
2081 *niloticus*. O dimensionamento da bacia de sedimentação seguiu o critério sugerido pela
2082 resolução do Conselho Estadual do Ambiente do estado do Ceará (COEMA). O ciclo foi
2083 definido em: a) as pós-larvas (PL10) adquiridas, 30 dias no berçário e sendo
2084 posteriormente, transferidas para os viveiros de engorda, onde passaram mais 90 dias; b)
2085 tilápias, cujo ciclo irá durar em média 350 dias dentro da bacia de sedimentação.

2086 **Análise de viabilidade**

2087 Os dados, estes foram tabulados caracterizando os valores monetários dos
2088 principais elementos que compõem os sistemas produtivos. Visando evitar perdas de
2089 informações foram utilizados dados de implantação de períodos de diferentes, assimos
2090 valores monetários de investimento foram deflacionados para o ano corrente de 2022.
2091 Para deflacionar utilizou-se a metodologia proposta por De-Losso (2020). A metodologia
2092 consiste em determinar um índice de inflação para obter um fator de deflacionamento de
2093 preço. O índice utilizado para calcular o fator de deflacionamento foi o Índice Geral de
2094 Preços-Mercado (IGP-M). A escolha do IGP-M ocorre por este levar em consideração na
2095 sua composição os produção agrícola (FGV, 2014).

2096 Os custos foram estabelecidos segundos os critérios definidos por Martin (1998).
2097 Assim, o custo operacional efetivo (COE) foi definido como despesas de operação e o
2098 material consumido, ou seja, o COE foi formado pela quantidade de insumos utilizados
2099 (ração, energia, pós-larvas, mão de obra, gerenciamento, outros) multiplicado pelo custo
2100 unitário. O custo operacional Total (COT) foi soma do COE mais os gastos com
2101 depreciação de benfeitorias, máquinas e equipamentos. Já a estimação da depreciação foi
2102 realizada por meio do método linear (Bordeaux-Rêgo, 2013) . A receita definida como a
2103 relação entre o preço de venda por quilograma multiplicado pelo total produzido.

2104 Os indicadores utilizados para definir a viabilidade do projeto foram: Valor
2105 Presente Líquido (VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR); Índice de Lucratividade (IL) e
2106 Payback (PPB). O VPL implica em trazer o fluxo financeiro gerado pelo projeto para o

2107 ano de início do investimento, descontado a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Como
2108 critério para a TMA utilizou a taxa de juros básica do Brasil, taxa SELIC de 13.75 %.

2109 No caso os indicadores podem trazer as seguintes informações: a) Resultado
2110 monetário do VPL pode ser interpretado segundo critério determinísticos, ou seja, VPL
2111 positivo indica que o projeto gerou renda e remunerou a TMA (Correia Neto, 2019); b)
2112 TIR indica, em termo percentual, quanto o projeto pode retornar e é usada em analogia
2113 com a TMA, logo, a TIR com valor superior a TMA indica que o projeto pode ser aceito
2114 e é rentável (Bordeaux-Rêgo, 2013; Correia Neto, 2019); c) IL é relação entre o custo
2115 total desembolsado (valor investido) e valores totais gerados (soma dos VPL's) durante
2116 o período de funcionamento; d) PPB é período (em anos) para obter o retorno do valor
2117 investido (Correia Neto, 2019).

2118 Por fim, os resultados zootécnicos, foram coletados dos ciclos de produção
2119 realizados em escala comercial na Estação Marinha de Aquicultura, Oceanografia,
2120 Universidade Federal de Rio Grande (FURG).

2121
2122 **Tabela 1** – Os valores médios dos indicadores zootécnicos utilizados para estimar os
2123 resultados econômicos no sistema de produção Misto, BFT e IMTA foram Densidade
2124 (cam.m⁻²), Sobrevivência (%), Peso final (g), Produtividade (kg.ha⁻¹.ciclo) e o Fator de
2125 Conversão Alimentar (FCA).

Índices	Misto	BFT	Multitrófico (IMTA)	
			Camarão	Tilápia
Densidade (cam.m ⁻²)	22	275	60	6
Sobrevivência (%)	64	76	75	80
Peso final (g)	25	13	20	840
Produtividade (kg/ha/ciclo)	3519.68	26,220.39	3,600	4032
FCA	1.69	1.40	1.5	0.85

2126

2127 **RESULTADOS**

2128 As alterações que ocorreram nos valores de instalação do sistema misto,
2129 Tecnologia de Bioflocos (BFT) e Multitrófico (IMTA) estão atreladas as mudanças e as
2130 exigências tecnológicas. Ressalta-se ainda, que os itens descritos não representam todos
2131 os desembolsos que podem ocorrer durante a implementação do sistema, mas os que
2132 causaram maiores impactos sobre o valor total investido no período analisado (Tabela 2).

2133

2134 **Tabela 2** – Valores médios de investimentos para o projeto de instalação dos diferentes
2135 sistemas de produção.

Sistemas						
Descrição	Misto		Multitrófico		BFT	
	Média (US\$)	%	Média (US\$)	%	Média (US\$)	%
1-Gastos Iniciais	11,332.79	3.00	16,172.51	3.68	15,653.60	4.62
<i>Projeto</i>	6,666.35	1.77	4,620.72	19.05	13,140.11	3.88
<i>Licenciamento</i>	4,666.44	1.24	11,551.79	2.63	2,513.49	0.74
2- Construção	185,122.91	49.06	268,452.96	61.08	155,838.04	45.98
<i>Movimentação de terra***</i>	114,294.49	30.29	184,828.65	42.06	81,657.55	24.09
<i>Taludes</i>	35,398.30	9.38				
<i>Sistema de abastecimento e drenagem</i>	31,998.46	8.48	40,431.27	9.20	10,809.12	3.19
<i>Berçários</i>	3,431.67	0.91	1,164.42	0.26		
<i>Comporta</i>			36,041.59	8.20		
<i>Tanques-rede</i>			5,987.04	1.36		
<i>Tanque de engorda</i>					63,371.37	18.70
3-Infraestrutura	9,278.70	2.46	15,017.33	3.42	57,119.66	16.85
<i>Construções</i>			15,017.33	3.42	4,279.83	1.26
<i>Galpão</i>	6,293.03	1.67			2,403.25	0.71
<i>Escritório</i>	2,985.67	0.79				
<i>Estufa</i>					50,436.58	14.88
4-Obras Complementares	22,699.97	6.02	8,086.25	1.84	6,214.46	1.83
<i>Instalação Elétrica</i>	22,699.97	6.02	8,086.25	1.84	6,214.46	1.83
5-Análise de água	421.58	0.11	8,317.29	1.89	3,494.84	1.03
<i>Equipamento e reagentes para a análise de água</i>	421.58	0.11	8,317.29	1.89	3,494.84	1.03
6-Aeradores	102,267.08	27.10	24,258.76	5.52	4,416.52	1.30
<i>Aeradores de pá</i>	102,267.08	27.10	24,258.76	5.52	4,416.52	1.30
7-Bombas	36,664.90	9.71	9,595.71	2.18	47,897.18	14.13
<i>Bomba Centrífuga</i>	35,331.63	9.36	5,714.31	1.30	16,334.32	4.82
<i>Soprador</i>	1,333.27	0.35	3,465.54	0.79	7,874.88	2.32
<i>Mangueira porosa</i>			415.86	0.09	3,423.86	1.01
<i>Tubos e Conexões</i>					20,264.12	5.98
8-Diversos	9,579.88	2.54	89,591.34	20.38	48,270.47	14.25
<i>Gerador</i>	5,733.06	1.52	17,327.69	3.94	20,095.11	5.93
<i>Outros**</i>	641.64	0.17	68,617.64	15.61	14,906.91	4.40
<i>Equipamentos e redes*</i>	3,205.18	0.85	3,646.01	0.83	2,602.19	0.77
<i>Geomembrana</i>					10,666.26	3.15
Total	377,367.80	100	439,492.15	100	338,904.77	100
Custo total por hectare	20,964.87		73,248.69		338,904.77	

2136 *Equipamento e rede: caiaques, tarrafas, rede para despesca, monoblocos, caixas, bomba da
2137 submersa, balança para despesca e balança digital.

2138 **Outros para misto: Estacas e bandejas de alimentação.

2139 **Outros para Multitrófico: tela anti-pássaros, tanques de fibra de vidro e veículos.

2140 Cotação dólar (01/12/2022): 5.1942.

2141

2142 Com relação ao custo de implantação, em termos absolutos, o sistema Multitrófico
2143 apresentou o maior gasto (\$439,492.15) em comparação com o BFT, que apresentou o
2144 menor custo de instalação (\$338,904.77) Já o sistema BFT comparado com o sistema
2145 IMTA apresentou uma redução de custo de \$38,463.03 (ou 10.19%) no valor de
2146 implantação.

2147 Assim quando se observa os valores de investimento por unidade de área
2148 produtiva percebe-se uma alteração do monte investido entre os sistemas. O
2149 superintensivo apresenta o maior valor de investimento por hectare (\$ 338,904.77)
2150 seguido do IMTA (\$ 73,248.69) e, por último, o sistema misto (\$ 20,964.87). Em valores
2151 percentuais, o desembolso com o sistema superintensivo por hectare foi de 1,516.54%
2152 superior ao sistema misto.

2153 Na decomposição do valor de investimento, o sistema misto mostra que
2154 construção absorveu 49.06% dos recursos financeiros; a compra de aeradores 27.10% e
2155 o item 'bombas' 9.71%, ou seja, do total necessário para a implantação 85.87% serão
2156 gastos com estes itens. Especificamente no item construção, o custo com movimentação
2157 de terra e taludes demandaram um total de \$8,316.27 (39.67%) por hectare. Para a compra
2158 dos aeradores por unidade produtiva foram desembolsados \$5,681.50. Já em 'Diversos',
2159 o subitem Equipamentos e Rede que trata do material da rotina de trabalho, apresentou
2160 um custo médio de valor \$3,205.18; gerador apresentou o maior impacto financeiro
2161 \$5,733.06.

2162 Em relação ao BFT, o gasto inicial (GI), particularmente, o pagamento do projeto
2163 apresentou o maior impacto (3.88%) enquanto o desembolso com licenciamento
2164 representou 0.74%. No geral, o valor do GI representou no total 4.62% do custo de
2165 instalação. O gasto com a construção do tanque absorveu 45.98% do investimento, pois
2166 engloba movimentação de terra, o sistema de abastecimento e drenagem e tanque de
2167 engorda. Para Infraestrutura, o principal gasto é representado com a compra da Estufa
2168 (14.88%). Por último, o gasto com Bombas e a instalação representou 14.13%.
2169 Acrescenta-se que os itens que foram mais significativos foram foi a aquisição da bomba
2170 centrífuga e o gasto com tubos e conexões (10.80%). No total, os pontos construções,
2171 infraestrutura e bombas representam 76.96%.

2172 Na implantação do sistema IMTA, em termos de valores absolutos, o custo foi
2173 16.46% superior a instalação do sistema misto, porém, em relação ao custo por hectare,
2174 o aumento equivale a 249.38%. Os gastos com construção, diversos e aeração

2175 correspondem a 86.98% do total investido. Em construção, os subitens movimentação de
2176 terra e sistema de abastecimento e drenagem são os elementos que apresentaram maiores
2177 influência representando 51.26%.

2178 No geral, os itens que formaram custos operacionais efetivos (COE) para sistema
2179 Misto, BFT e IMTA são constituídos dos mesmos insumos (ração, pós-larvas,
2180 fertilizantes, probióticos, energia, alcalinizantes, combustível e cloro), porém, no IMTA
2181 há adição de alevinos de tilápia do Nilo. Adicionalmente, a quantidade utilizada de cada
2182 insumo muda com a mudança do sistema. A mão de obra é outro importante componente
2183 da estrutura de custos que também passou por alteração com a mudança de estratégias de
2184 produção.

2185 O sistema misto apresentou o maior desembolso anual com o COE (\$612,214.85)
2186 seguido do IMTA (\$160,874.12) e BFT (\$212,491.40) respectivamente. Contudo, assim
2187 como ocorreu no investimento, quando a análise ocorre por hectare, IMTA apresentou o
2188 menor custo (\$26,812.36), posteriormente, o misto (\$34,011.92) e BFT (\$212,491.40).

2189 Os gastos relacionados com o COE têm variações expressivas entre os sistemas.
2190 Em todas os sistemas de produção a ração foi o maior custo. No sistema Misto o gasto
2191 com alimentação correspondeu a 71.20% do COE; já nos IMTA e BFT corresponderam,
2192 respectivamente, a 41.44% e 43.49 do gasto efetivo. Para energia e compra das pós-larvas
2193 e alevinos há forte alteração em função do sistema. Enquanto no BFT energia representa
2194 20.39% dos gastos com o COE para o sistema Misto e IMTA este item representa,
2195 respectivamente 3.76% e 8.85%. Para mão de obra (Gerente, técnicos, arraçoadores e
2196 segurança), que no sistema Misto constitui um total de 9.45%, nos sistemas BFT e
2197 Multitrófico somam, respectivamente, 20.80% e 30.12% (Gráfico 1).

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208 **Gráfico 1-** Relação participação, em termos percentuais, dos diferentes itens que
 2209 compõem o custo operacional efetivo (Mão de obra, outros, energia, alcalinizantes,
 2210 fertilizantes, ração, pós-larvas) para os sistemas Misto, Multitrófico e BFT.

2211
 2212 **Outros é constituído por gastos com cloro, combustível e probiótico.

2213
 2214 Quanto aos indicadores de rentabilidade (Tabela 3) o maior VPL foi encontrado
 2215 no sistema Misto (\$ 2,328,454.74), seguido do sistema BFT. Com relação a Taxa Interna
 2216 de Retorno (TIR) o sistema Multitrófico apresentou o menor valor (3.50%) e o maior foi
 2217 no sistema Misto (110.47%). O menor tempo de retorno para o valor investido (*Payback*)
 2218 mostra que o sistema Misto precisou de dois anos; enquanto no IMTA 10 anos. Quanto
 2219 ao índice de lucratividade o maior resultado foi encontrado no sistema Misto (\$ 7.17) e o
 2220 menor no IMTA (\$1.18).

2221
 2222 **Tabela 3 - Resultados dos indicadores econômicos para o sistema Misto, Tecnologia**
 2223 **bioflocos e Multitrófico considerando como taxa mínima de atratividade a taxa básica de**
 2224 **juros, Selic, que no ano de 2022 era de 13.75%. O fluxo de caixa foi projetado para um**
 2225 **período de 10 anos.**

Descrição	MISTO	Multitrófico	BFT	
VPL (U\$\$)	2,328,454.74	80,232.52	302,762.27	
TIR (%)	110.47	3.50	17.44	
MTIR (%)	31.60	9.29	15.03	
Índice de Lucratividade (IL) (U\$\$)	7.17	1.18	1.89	
Payback descontado (anos)	2	10	4	
COE Anual (U\$\$)	612,214.85	160,875.12	212,491.40	
COT Anual (U\$\$)	639,035.07	185,404.69	238,716.90	
Ponto de nivelamento (kg)	103,723.38	35,666.37	51,662,32	
Produção(kg)	190,062.47	58,032.00	78,661.17	
Preço de venda (kg/U\$\$)	6.16	5.20	1.41	4.62
Receita (U\$\$)	1,170,966.32	286,390.88	363,470.94	

2226
2227 O COE e COT mostram os desembolsos para operacionalizar os diferentes
2228 sistemas. No BFT cerca de 58.46% da receita anual é utilizada para custear o COE, no
2229 IMTA este valor corresponde a 56.17%; na estratégia com o emprego do sistema misto o
2230 resultado ficou em 52.28%. Com relação ao COT, o valor total por quilograma de foi de
2231 \$3.36; \$3.20 e 3.04, respectivamente, para o sistema Misto, IMTA e BFT. No que diz
2232 respeito ao quanto do custo médio de produção representa no preço de venda por
2233 quilograma no sistema misto, IMTA e BFT, equivale, respectivamente, a 54.55%, 61.54%
2234 e 65.80%.

2235 Quando ao ponto de nivelamento, os resultados mostram que para quitar o custo
2236 anual do COT seria necessário utilizar, respectivamente, 54.57%, 61.46% e 65.68% da
2237 produção do sistema Misto, Multitrófico e BFT.

2238 Com relação aos valores de investimento, produção e receita por área de produção;
2239 o sistema com maior exigência tecnológico, o BFT, demandou o maior volume
2240 financeiro, porém, apresentou a maior produção e receita por hectare. Enquanto o sistema
2241 Misto gerou uma produção de 3,519.68 kg/ha/ciclo e receita anual de U\$\$ 21,684,54 por
2242 hectares; o multitrófico apresentou uma queda de receita de 26.63% em relação ao misto;
2243 em contrapartida, o BFT, teve um aumento de receita de 458.72% ocasionado pelo
2244 aumento de produção.

2245

2246 Na avaliação da implantação dos sistemas analisados, houve a constatação de que
2247 há variação de impacto no custo de investimento, contudo, a etapa de construção
2248 constituiu o principal gasto entre os sistemas. Especificamente, a compra de aeradores,
2249 diversos e infraestrutura que afetaram os gastos com instalação, respectivamente, para o
2250 sistema misto, IMTA e BFT. O sistema misto e IMTA contavam com a mesma quantidade
2251 e potência de aerador, porém, devido a maior área de produção o gasto com os aeradores
2252 foi maior no sistema misto. Já no IMTA o maior impacto com diversos comparado com
2253 os outros ocorreu devido a necessidade de aquisição de tela anti-pássaros para cobrir os
2254 tanques. Já o BFT o maior impacto na infraestrutura ocorreu devido a aquisição das
2255 estufas.

2256 Com relação ao custo para operacionalizar o sistema (COE), a ração se
2257 caracterizou como o item com maior peso. Entre os sistemas este insumo apresentou
2258 variação entre 41.44% e 71.20% do COE. É importante destacar que, como citado
2259 anteriormente, apesar dos sistemas apresentarem os mesmos insumos a quantidade e

2260 proporção utilizada varia conforme o sistema avaliado. O sistema misto devido a maior
2261 produção apresentou, majoritariamente, maior gasto com ração. O IMTA e o BFT além
2262 dos gastos com ração demandaram um maior gasto com mão de obra e, especificamente
2263 para o BFT, com energia. Com relação ao custo com energia, é importante destacar que
2264 a maior demanda afetou o COE para o BFT.

2265 A análise dos indicadores de rentabilidade demonstra para as diferentes
2266 tecnologias os eventos determinísticos esperados. Em vista do critério para tomada de
2267 decisão o sistema misto mostrou ser o sistema mais rentável. O maior peso final, melhor
2268 preço de venda e a menor relação entre custo médio de produção e preço de venda são
2269 fatores que afetam positivamente o sistema. É importante destacar que mesmo com menor
2270 sobrevivência (64%) e maior conversão alimentar (1.69) não foram o suficiente para
2271 afetar negativamente os resultados de rentabilidade.

2272 Para o BFT o aspecto da alta produtividade e, conseqüentemente, o sistema com
2273 maior produção por área favoreceu o resultado positivo dos indicadores, no entanto, na
2274 relação entre o custo médio de produção e preço de venda é possível observar efeito
2275 negativo sobre os indicadores, caracterizado por meio do aspecto do ponto de nivelamento
2276 que identificou o maior resultado. Com relação ao multitrófico, o menor peso final e,
2277 conseqüentemente, o menor preço de venda e o elevado custo da produção foram
2278 responsáveis por afetar o resultado de viabilidade do empreendimento, visto que a
2279 produtividade é superior ao sistema misto.

2280

2281 **DISCUSSÃO**

2282 Valenti et al. (2021) descrevem como vantagens do sistema tradicional a
2283 facilidade de operacionalização, baixo consumo de insumo (principalmente, ração) e
2284 viabilidade financeira. Nesse aspecto, unir a tecnologia de intensificação com sistema
2285 tradicional pode trazer ainda mais vantagens, principalmente, devido ao incremento que
2286 sistemas biosseguros podem trazer aos indicadores de resultados zootécnicos. Por outro
2287 lado, o BFT apresenta a possibilidade de produção em qualquer área e ganhos de
2288 produtividades superiores aos sistemas tradicionais, porém é necessário avaliar a
2289 viabilidade econômico-financeira da produção (Hargreaves, 2013). O multitrófico ao
2290 incluir outra espécie, que atuará como consumidora dos resíduos gerados pela espécie
2291 alvo, reduzir a pressão sobre o ambiente e, adicionalmente, produzir outra espécie que
2292 pode ser utilizada tanto para o consumo como para venda.

2293 Especificamente, entre os resultados dos VPL's, o maior valor foi encontrado no
2294 sistema misto (\$2,328,454.74), seguido pelo BFT (302,762.27) e IMTA (\$80,232.52).
2295 Bordeaux-Rêgo (2013) e Correia Neto (2019) descrevem o resultado positivo do VPL
2296 como uma situação de geração de riqueza. Os autores ao discorrerem sobre a TIR e TIRM
2297 relatam a necessidade de um critério de avaliação externo para estabelecer uma
2298 comparação, que é a taxa mínima de atratividade (TMA, 13.75%). Nesta situação, a TIR
2299 do sistema misto (110.47%) e BFT (17.44%), assim como, a TIRM (respectivamente,
2300 31.60% e 15.03%, para o misto e BFT) foram superiores ao valor de TMA.

2301 Para o IMTA, o valor de VPL foi maior que zero ($VPL > 0$), porém os resultados
2302 de TIR e TIRM (3.50% e 9.29%) foram inferiores a TMA. Os valores de preço de venda,
2303 volume de produção e o elevado valor de custo de produção afetaram negativamente estes
2304 indicadores.

2305 Rego et al. (2016) avaliaram a implantação de projetos aquícolas destinados a
2306 produção do camarão marinho por meio da adoção do BFT contra sistema tradicional no
2307 estado de Pernambuco. Os autores identificaram que o custo de implantação de um
2308 hectare destinado ao cultivo tradicional era 10 vezes menor que o BFT isso devido ao
2309 elevado custo com capital fixo representado por desembolso com construção de tanques
2310 e sua impermeabilização além dos gastos com a implantação do sistema de abastecimento
2311 e drenagem. Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os valores
2312 encontrados por Rego et al. (2017), por hectare, a implantação da tecnologia BFT foi
2313 1,516.54% e 362.67% superior, respectivamente, ao sistema misto e IMTA.
2314 Adicionalmente, o principal custo foi com construção que engloba a construção dos
2315 tanques e sistema de abastecimento e drenagem.

2316 Para a produção de camarão marinho em sistema tradicional no Rio Grande do
2317 Norte, Silva et al. (2012) declararam que para conseguir uma produção anual de 20.554
2318 kg seria necessário investir 73.86% do valor total apenas com obras de estrutura básicas,
2319 valor superior ao encontrado no sistema misto (49.06%) e IMTA (44.53%) que operam
2320 em viveiros. Rego et al. (2016) relataram que no processo de implantação do sistema
2321 tradicional foi utilizado 59.48% do valor investido com movimentação de terra e o
2322 sistema de abastecimento e drenagem.

2323 Para os indicadores avaliados, os resultados encontrados por Coelho (2005), da
2324 Silva et al. (2012) e Rego et al. (2017) para o cultivo em sistema tradicional mostram
2325 VPL positivo e TIR superior a valor a taxa de referência (TMA). Segundo os autores, os
2326 fatores que favorecem o sistema tradicional são: melhor preço de venda, menor custo

2327 médio de produção e, conseqüentemente, a melhor relação entre receita e despesas. No
2328 estudo, o melhor resultado encontrado, no sistema misto, ratifica os fatores elencados
2329 pelos autores supracitados e que tornam este sistema menos vulnerável a perda e
2330 oscilações de preços.

2331 Este estudo identificou que os resultados dos indicadores de rentabilidade para o
2332 BFT foram superiores aos critérios de tomada de decisão ($VPL > 0$ e $TIR > TMA$). Contudo,
2333 Rego et al. (2017a, 2017b) descrevem que o elevado custo para a implantação do
2334 empreendimento aquícola e o alto custo médio de produção pode tornar o projeto frágil
2335 às incertezas. Os resultados encontrados no estudo corroboram com as afirmações dos
2336 autores que, apesar do alto incremento produtivo viabilizado pelo sistema BFT, o volume
2337 necessário de insumos no processo produtivo pode aumentar os riscos, particularmente,
2338 diante das variações de preços. Almeida et al. (2021) observaram que a instalação de
2339 projeto que utilizam a tecnologia BFT em regiões que praticam preços diferenciados pode
2340 ser uma forma viável para diminuir a vulnerabilidade do projeto, sendo assim, é possível
2341 incrementar os resultados dos indicadores de rentabilidade.

2342 O presente estudo avaliou, nas condições descritas para o cultivo em IMTA, que
2343 apesar de apresentar um VPL positivo, os outros indicadores mostraram-se inferiores ao
2344 critério de decisão, por exemplo o (TMA). Entre os fatores que prejudicaram os
2345 indicadores estão o nível de produção, tamanho do camarão de despesca, preço de venda
2346 (camarão e peixe) e o elevado ponto de nivelamento. Neste sentido, Castilho-Barros et al.
2347 (2018) alegam que os sistemas integrados apresentam uma fragilidade em relação a
2348 variação dos preços. Contudo, os resultados descritos aqui indicam que a viabilidade
2349 deve ocorrer via mudança do planejamento produtivo para alcançar, ao final do ciclo, um
2350 incremento de produção e de peso de despescas. Adicionalmente, a legislação nacional
2351 trata os sistemas que visam a produção integrada e redução do lançamento de efluente e
2352 de resíduos como de menor impacto o que pode facilitar a expansão da atividade aquícola
2353 através destes sistemas.

2354 Com relação aos custos de operação, o COE foi o custo que mais impactou sobre
2355 o custo total de produção (COT) dos sistemas avaliados. A ração, energia e mão de obra
2356 são os itens que apresentaram os maiores pesos, totalizando, 84.68% para o BFT.
2357 Almeida et al. (2021) identificaram que o custo com ração para uma produção com
2358 densidade média de 400 camarões.m⁻², representou 83.89% dos custos variáveis. O
2359 processo de minimização dos gastos com ração dependerá da taxa de conversão alimentar,
2360 da qualidade da ração ofertada e da produtividade primária do sistema (Avnimelech e

2361 Kochba, 2009; Jory et al., 2001). Em paralelo, Hargreaves (2013) declara que o
2362 dimensionamento do sistema de aeração dependerá da quantidade de ração ofertada
2363 diariamente, logo, quanto maior a oferta de ração maior a demanda por energia.

2364 No sistema misto os maiores custos foram com mão de obra e ração 80.65%. Os
2365 resultados divulgados por Rego et al. (2016) para a produção em viveiros, validam os
2366 valores deste estudo. Os resultados dos sistemas analisados foram influenciados por
2367 assumir valores de Densidade, Sobrevivência, Peso médio final e FCA diferentes do autor
2368 supracitado, impactando, portanto, os resultados de produção, receita, indicadores de
2369 rentabilidade, COE, COT e COP. Vale ressaltar, que para o sistema Multitrófico a
2370 diferença ocorreu até mesmo para as espécies avaliadas, visto que, optou-se por animais
2371 que já têm cadeia produtiva consolidada.

2372 É importante ressaltar que há fatores que influenciam nos custos de implantação
2373 dos empreendimentos que não podem ser mensurados diretamente, como: a diferença
2374 salarial entre os estados e/ou regiões, custo com o transporte dos insumos, as relações de
2375 externalidades positivas e negativas em decorrência da presença de concorrentes,
2376 alterações decorrentes das mudanças cambial e o efeito das políticas regionais no
2377 processo de licenciamento e incentivo da atividade. Além disso, como informam Coelho
2378 (2005) e Campos (2006) sempre haverá a necessidade de planejamento por meio de uma
2379 análise em relação ao volume de produção, custos e indicadores de rentabilidade para
2380 auxiliar na minimização das incertezas e otimizando resultado e o reflexo de tal atitude
2381 acarretará melhora nos indicadores econômicos.

2382 **CONCLUSÃO**

2383 O sistema misto apresentou os melhores resultados dos indicadores econômicos.
2384 O BFT demonstrou melhor capacidade produtiva e com resultados de rentabilidade
2385 superior ao critério de decisão. O Multitrófico apresentou margem de produtividade
2386 superior ao sistema misto, contudo, em relação aos indicadores de rentabilidade o sistema
2387 carece por melhores resultados, além disso, este sistema conta com legislação, a nível
2388 nacional, que trata de incentivar sistemas de produção que priorizem a adoção deste tipo
2389 de sistema produtivo.

2390 No processo de avaliação de empreendimento aquícola a análise de investimento
2391 e dos custos deve ser elemento comum, visto que, a relação de viabilidade técnica não
2392 implica em viabilidade financeiro-econômico. Além disso, é preciso considerar ao longo

2393 da análise de projeto, o local, os concorrentes, fornecedores, preços ofertados pelo
2394 produto e o efeito das legislações ambientais e de licenciamento.

2395 No geral, todos os sistemas apresentaram-se como uma alternativa para produção
2396 do camarão marinho. Contudo, os resultados, particularmente, do sistema de bioflocos e
2397 IMTA apresentam margem para incrementar positivamente os indicadores de viabilidade
2398 econômica.

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425 **REFERÊNCIAS**

- 2426 ABCC/MPA, 2013. Levantamento da infraestrutura produtiva e dos aspectos
2427 tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais da carcinicultura marinha no Brasil
2428 em 2011.
- 2429 Abreu, M.C.S. de, Mattos, P. de, Lima, P.E.S., Padula, A.D., 2011. Shrimp farming in
2430 coastal Brazil: Reasons for market failure and sustainability challenges. *Ocean*
2431 *Coast. Manag.* 54, 658–667. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.06.012>
- 2432 Avnimelech, Y., Kochba, M., 2009. Evaluation of nitrogen uptake and excretion by
2433 tilapia in bio floc tanks, using ¹⁵N tracing. *Aquaculture* 287, 163–168.
2434 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.10.009>
- 2435 Bordeaux-Rêgo, R. et al, 2013. Viabilidade econômico-financeira de projetos, 4^o. ed. Rio
2436 de Janeiro.
- 2437 Campos, C., 2006. Alternativa econômica para o novo rural do nordeste brasileiro : o
2438 cultivo do camarão *Litopenaeus vannamei*. *GEPEC* 10, 40–53.
- 2439 Castilho-Barros, L., Almeida, F.H., Henriques, M.B., Seiffert, W.Q., 2018. Economic
2440 evaluation of the commercial production between Brazilian samphire and whiteleg
2441 shrimp in an aquaponics system. *Aquac. Int.* 26, 1187–1206.
2442 <https://doi.org/10.1007/s10499-018-0277-8>
- 2443 Chopin; Buschmann; Halling; Troell; Kautsky; Neori; Kraemer; Zertuche-González;
2444 Yarish; Neefus, 2001. Integrating seaweeds into marine aquaculture systems : a key
2445 toward sustainability. *J. Phycol* 986, 975–986.
- 2446 Coelho, A.M.S., 2005. Análise de custo/volume/lucro e investimentos em carcinicultura
2447 de pequeno porte. *Custos e Agronegocio* 1, 62–84.
- 2448 Correia Neto, J.F., 2019. *Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento*.
- 2449 Silva, S.L.G., Pontes, F.S.T., Pontes, F.M., Bessa, A.P., de Oliveira, D.M., 2012. Análise
2450 de investimento na carcinicultura do Rio Grande do Norte: Um estudo de caso. *Rev.*
2451 *Caatinga* 25, 168–175.
- 2452 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Fôes, G.K., Rosas, V.T., Wasielesky,
2453 W., 2022. The effect of partial harvest on production and growth performance of
2454 *Litopenaeus vannamei* reared in biofloc technologic system. *Aquaculture* 546.
2455 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737408>
- 2456 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Rosas, V.T., Wasielesky, W., 2020.
2457 Hyperintensive stocking densities for *Litopenaeus vannamei* grow-out in biofloc
2458 technology culture system. *J. World Aquac. Soc.* 51, 1290–1300.
2459 <https://doi.org/10.1111/jwas.12718>
- 2460 De-losso, R., 2020. Deflacionamento 18–24.
- 2461 Almeida, M.S., Carrijo-Mauad, J.R., Gimenes, R.M.T., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S.,
2462 Poersch, L.H., Wasielesky, W., Fôes, G.K., 2021. Bioeconomic analysis of the

- 2463 production of marine shrimp in greenhouses using the biofloc technology system.
2464 Aquac. Int. 29, 723–741. <https://doi.org/10.1007/s10499-021-00653-1>
- 2465 FAO, 2022. World Fisheries and Aquaculture, FAO:Rome,2022.
- 2466 Ha, T.T.T., van Dijk, H., Bush, S.R., 2012. Mangrove conservation or shrimp farmer's
2467 livelihood? The devolution of forest management and benefit sharing in the Mekong
2468 Delta, Vietnam. Ocean Coast. Manag. 69, 185–193.
2469 <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.07.034>
- 2470 Hanson, T., Ph, D., Morris, T., 2013. Economic Analyses Project Rising Returns For
2471 Intensive Biofloc Shrimp Systems. Glob. Aquac. Advocate 2011–2013.
- 2472 Hargreaves, John A, 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture Southern
2473 regional aquaculture center. SRAC Publ. 1–12.
- 2474 Holanda, M., Santana, G., Furtado, P., Rodrigues, R.V., Cerqueira, V.R., Sampaio, L.A.,
2475 Wasielesky, W., Poersch, L.H., 2020. Evidence of total suspended solids control by
2476 *Mugil liza* reared in an integrated system with pacific white shrimp *Litopenaeus*
2477 *vannamei* using biofloc technology. Aquac. Reports 18.
2478 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100479>
- 2479 Krummenauer, D., Peixoto, S., Cavalli, R.O., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2011.
2480 Superintensive culture of white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in a biofloc
2481 technology system in Southern Brazil at different stocking densities. J. World
2482 Aquac. Soc. 42, 726–733. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2011.00507.x>
- 2483 Martin, N.B., Serra, R., Oliveira, M.D.M., Ângelo, J.A., Okawa, H., 1998. Sistema
2484 integrado de custos agropecuários - CUSTAGRI. Informações Econômicas v. 28,
2485 n.1 28, 7–28.
- 2486 Ostrensky, A., Pont, D.J.S.G.D., Cozer, G.G.C.-W.M.V.F.G.N., Silva, R.F. de A.G.-M.U.
2487 de A.T. da, 2017. a Produção Integrada Na Carcinicultura Brasileira Volume I.
2488 Curitiba.
- 2489 Patarra, 2019. Aquacultura Multi-Trófica Integrada (IMTA) e as macroalgas marinhas.
2490 UAciência 29.
- 2491 Poli, M.A., Legarda, E.C., Lorenzo, M.A. De, Martins, M.A., Vieira, N., 2019. Pacific
2492 white shrimp and Nile tilapia integrated in a bio fl oc system under di ff erent fi sh-
2493 stocking densities 498, 83–89. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.08.045>
- 2494 Queiroz, L., Rossi, S., Meireles, J., Coelho, C., 2013. Shrimp aquaculture in the federal
2495 state of Ceará, 1970-2012: Trends after mangrove forest privatization in Brazil.
2496 Ocean Coast. Manag. 73, 54–62. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.11.009>
- 2497 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017a. Financial viability of inserting
2498 the biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* farm: a case study
2499 in the state of Pernambuco, Brazil. Aquac. Int. 25, 473–483.
2500 <https://doi.org/10.1007/s10499-016-0044-7>
- 2501 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017b. Risk analysis of the insertion

2502 of biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* production in a farm
2503 in Pernambuco, Brazil: A case study. *Aquaculture* 469, 67–71.
2504 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.12.006>

2505 Samocha, T.M., 2019. Sustainable Biofloc Systems for, Sustainable Biofloc Systems for
2506 Marine Shrimp.

2507 Valenti, W.C., Barros, H.P., Moraes-Valenti, P., Bueno, G.W., Cavalli, R.O., 2021.
2508 Aquaculture in Brazil: past, present and future. *Aquac. Reports* 19, 100611.
2509 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529 **CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA-ECONÔMICA DA PRODUÇÃO**
2530 **COMERCIAL DO CAMARÃO MARINHO (*Litopenaeus vannamei*) EM SISTEMA**
2531 **BIOFLOCOS COM SALINIZAÇÃO ARTIFICIAL**

2532

2533 Fellipy Augusto Holanda Chaves¹; Gabriel Keiti Koike Santana¹; Henrique Jun Koike
2534 Santana¹; Kilmer Coelho Campos²; Geraldo Kipper Fóes¹; Wilson Wasielesky Jr.¹; Luis
2535 Henrique Poersch¹

2536 ¹Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Instituto de Oceanografia, Universidade
2537 592 Federal do Rio Grande - FURG; Rua do Hotel, n°2, Cassino, Rio Grande, RS, Brazil.
2538 593 CEP: 96210-030.

2539 ²Programa de Pós-graduação em Economia Rural, Departamento de Economia Agrícola,
2540 Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Av. Mister Hull, 2977-
2541 Campus do Pici, Bloco 826. Fortaleza-Ceará, Brasil. CEP:60440-970.

2542 Autor por correspondência: Universidade Federal do Rio Grande (PPGAq-IO-FURG),
2543 Rua do Hotel n° 2, Cassino, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96210-030 E-
2544 mail: fellipychaves@gmail.com (Fellipy A.H. Chaves).

2545

2546 **RESUMO**

2547 Os cultivos de camarão marinho praticados em águas com baixa salinidade têm
2548 apresentado nos últimos anos tendência de crescimento. Contudo, a diferença na
2549 composição iônica destas águas em relação às marinhas gera a necessidade de correções
2550 para melhorar os resultados zootécnicos e econômicos. Neste sentido, devido ao volume
2551 de água dos tanques de cultivo, os sistemas fechados, especificamente utilizando sistema
2552 BFT, tem sido caracterizado como mais eficiente no aproveitamento do uso dos insumos.
2553 O objetivo desse trabalho é relatar os resultados zootécnico e, adicionalmente mostrar os
2554 resultados de viabilidade desse sistema. Além disso, para caracterizar a possível
2555 flutuações de produção e preço foi utilizado a análise de cenários. Os resultados
2556 zootécnicos de peso final, ganho de peso semanal, biomassa final, conversão alimentar,
2557 sobrevivência e produtividade; correspondem a dois ciclos de produção realizados com a
2558 densidade de 300 camarões.m⁻². Em relação aos indicadores de viabilidade, foi utilizado
2559 o fluxo de caixa para um período de 10 anos, com taxa mínima de atratividade de 13.75%
2560 ao ano no cálculo do valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), taxa
2561 interna de retorno Modificada (TIRM) e payback descontado (PBD). Os resultados

2562 indicam que ao nível de produção alcançado os indicadores demonstram que não houve
2563 viabilidade. Contudo, ao considerar a variação positiva da produção (15%) e dos preços
2564 (30%) o sistema torna-se viável com capacidade de retorno do capital investido em quatro
2565 anos. Assim, ao considerar um investimento como este, é importante considerar as
2566 variações dos preços e o custo médio de produção, bem como o nível de produção que
2567 permita maximização da produção e dos resultados financeiros.

2568

2569 **Palavras-chave:** *Litopenaeus vannamei*, Balanço iônico, águas interiores, indicadores
2570 econômicos

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596 INTRODUÇÃO

2597 O cultivo em águas interiores aumentou 6.03%, no período de 2016 a 2020, isto
2598 porque, países que antes não tinham produções expressivas passaram a ganhar destaque
2599 especificamente com cultivo de crustáceos, com crescimento de 48.85% (FAO, 2022).

2600 Este grupo apresenta como principal organismo de cultivo o camarão marinho
2601 *Litopenaeus vannamei*. Dentre as características que o fizeram *L. vannamei* se destacar
2602 está a habilidade de adaptação a ampla variação de salinidade. Samocha (2019)e; Wyk et
2603 al. (1999) descrevem os peneídos como animais com excelente capacidade
2604 osmorregulatória capaz de suportar variação de salinidade que vão de 1.0 a 35 g/L. Assim,
2605 é possível encontrar empreendimento aquícolas tanto em ambiente costeiro como em
2606 águas interiores.

2607 No Brasil, Valenti et al. (2021) descreveram o processo de interiorização da
2608 carcinicultura como uma realidade na região Nordeste. Miranda et al. (2008) comentaram
2609 que a expansão nesta região foi possível devido a criação de um pacote tecnológico
2610 específico. Maicá et al. (2012) relataram que este tipo de cultivo demonstrou ter
2611 viabilidade técnica e econômica, além disso, elencam entre as vantagens: a redução do
2612 custo da terra, critérios menos rigorosos em relação as exigências legais e a diminuição
2613 da pressão ambiental na zona costeira. Do ponto de vista econômico, Pinto et al. (2020)
2614 enaltecem a questão da geração de renda e da melhoria na condição social regional.

2615 Entretanto, do ponto de vista ambiental Maicá et al. (2012) afirmaram que o
2616 lançamento de efluente não tratado oriundo do cultivo do *L. vannamei* em sistemas
2617 tradicionais e a exigência por troca de grandes volumes de água interferem na
2618 sustentabilidade da atividade. Além disso, a fisiológica do animal é afetada pela
2619 composição iônica da água que, no caso das águas oligohalinas, apresentaram
2620 composição diferente do ambiente marinho, que pode afetar os resultados zootécnicos
2621 (Boyd et al., 2009; Li et al., 2017).

2622 Nesse sentido, é necessário realizar correção da composição iônica do cultivo
2623 realizado em baixa salinidade. Segundo Boyd et al. (2002) a estratégia de utilização de
2624 concentrado hipersalino, fruto da evaporação da água marinha que apresenta todos os íons
2625 majoritários, tem sido utilizado com sucesso para a correção do desbalanço iônico.

2626 No cultivo realizado em baixa salinidade, a interação salinização e/ou correção
2627 iônica e o sistema de produção devem ser avaliadas. Nesse aspecto, como a alternativa ao
2628 cultivo tradicional, Maicá et al. (2012) demonstraram que é tecnicamente possível

2629 produzir camarões marinhos em águas de baixa salinidade utilizando sistema sem troca
2630 de água e com densidade superintensiva. Moura et al. (2021) complementam que a
2631 tecnologia de bioflocos dentro de suas próprias características, tais como: pouca ou
2632 nenhuma troca de água, o reuso da mesma água por diversos ciclos (Krummenauer et al.,
2633 2014) e o uso racional dos insumos (Hargreaves, 2013; Samocha, 2019) são
2634 características que tornam o processo de salinização adequado para esta tecnologia.

2635 Hanson et al. (2013) ressaltam que para o sistema BFT as informações econômicas
2636 devem ter atenção especial, particularmente, com respeito ao investimento e ao custo
2637 operacional. Nesse sentido, há pouca informação econômica sobre o sistema BFT e/ou
2638 BFT com salinização. Por exemplo cita-se o estudo pioneiro realizado por Pinto et al.
2639 (2020) que traz informações da relação entre os indicadores zootécnicos, nutricionais e
2640 resultados econômicos, contudo, as informações são referentes a dados em escala
2641 laboratorial.

2642 Assim, o objetivo do presente estudo é avaliar e trazer informações quanto a
2643 viabilidade financeira e econômica do sistema BFT em nível comercial usando o processo
2644 de salinização artificial com densidade superintensiva no cultivo do camarão marinho na
2645 região Sul do Brasil.

2646 **METODOLOGIA**

2647 1.1. Origem dos dados

2648 Os dados de produção do cultivo em sistema BFT com salinização bem como seus
2649 gastos são de origem primária coletados por meio de entrevistas realizadas com o
2650 responsável técnico pelo empreendimento (unidade produtiva localizada na cidade de
2651 Tapes, Rio Grande do Sul, Brasil).

2652 Os resultados produtivos são relativos aos cultivos realizados entre os anos de
2653 2019 e 2020. As pós-larvas utilizadas foram adquiridas no estágio de pl₁₀ e foram
2654 aclimatadas em berçários onde permaneceram, respectivamente, durante 55 e 59 dias.
2655 Posteriormente, ao alcançarem 1.19 g de peso médio; os juvenis de *L. vannamei* foram
2656 transferidos para dois tanques de engorda em densidade de 300 camarões.m⁻³
2657 permanecendo por 64 e 78 dias, ou seja, em média, o ciclo produtivo durou 128 dias. Para
2658 o processo de fertilização dos tanques foi utilização melaço de cana-de-açúcar como fonte
2659 de carbono orgânico na proporção de 20: 1 (ou seja, para cada 1.0 mg de nitrogênio seriam
2660 utilizados 20 mg de carbono orgânico) durante três dias e as correções eram realizadas

2661 sempre que a concentração de amônia ultrapassava 1.0 mg.L^{-1} na proporção C: N de 6: 1
2662 (Ebeling et al., 2006).

2663 O sistema foi projetado para operar com tanques de 265 m^3 cobertos com mantas
2664 de PEAD de 0.8 mm implantados dentro de estufas e com sistema de aeração constituído
2665 por mangueiras microperfurada (Aerotube ®) e compressor de ar trifásico 5.0 CV
2666 (Modelo CR9). Além disso, no empreendimento havia edificação para guarda de
2667 equipamento de manutenção, operação, ração, laboratório de qualidade de água e
2668 decantadores para os sólidos suspensos totais.

2669 As despescas foram realizadas em momentos diferentes. O primeiro tanque foi
2670 despescado quando os animais atingiram o peso médio de 14.82 g, já a segunda ocorreu
2671 com peso médio de 19.76 g.

2672

2673 ***Salinização***

2674 A água utilizada no cultivo foi captada da chuva através das calhas das
2675 greenhouses. Esta água foi inicialmente clorada na concentração 10ppm e declorada por
2676 meio de aeração. Após este processo, foram realizadas as homogeneizações, com adição
2677 dos sais necessários. Os sais utilizados foram adquiridos em empresas especializadas,
2678 sendo o critério de seleção atrelado a necessidade do correto balanço iônico, a otimização
2679 dos custos, bem como, proporcionar as mesmas relações iônicas encontradas na água
2680 marinha.

2681

2682

2683 ***d) Análise econômica***

2684 Utilizou-se as metodologias propostas por Bordeaux-Rêgo (2013) e Correia Neto
2685 (2019). Para definir os custos operacionais totais foram utilizados os dados coletados e
2686 extrapolados para o sistema. Assim, para estruturar os custos adotou-se o modelo sugerido
2687 por Martin et al. (1998). Segundo os autores, custo operacional efetivo (COE) são os
2688 gastos efetivamente desembolsados (rações, energia, mão de obra temporária, melão,
2689 probiótico e alcalinizantes) para produzir numa determinada área. Outros custos
2690 operacionais (OCO) que levam em conta o gasto com depreciação de máquinas,
2691 equipamentos e benfeitoria da estrutura produtiva e impostos (CESSR equivalente a
2692 2.70% da produção e FGTS de 35.97% da folha de pagamento). Por último, o “custo
2693 operacional total” (COT) que consiste no somatório dos custos anteriores.

2694 Em relação a receita bruta (RB), esta foi o produto do valor médio do preço de
2695 venda praticado no Brasil pela produção média esperada (Martin et al., 1998). Para indicar
2696 o volume mínimo de produção ideal que cobrirá o COT utilizou-se o ponto de
2697 nivelamento operacional total. Descrito também por Martin et al. (1998) este indicador
2698 mostra a relação entre o COT e o preço por quilograma (R\$/kg).

2699 O fluxo de caixa foi elaborado após o levantamento dos custos e receitas geradas
2700 pelo sistema e por meio deste foi possível realizar as análises de viabilidade econômica.
2701 Além disso, o fluxo de caixa foi estimado para um período de 10 anos.

2702 Quanto aos índices econômicos, foi necessário antes determinar o valor
2703 considerado atraente ou qual o risco o investidor estaria disposto a tolerar para entrar na
2704 atividade. Este critério é definido pela taxa mínima de atratividade (TMA). Para isso
2705 usou-se como referência a taxa básica de juros brasileira (taxa Selic) no ano de 2022 que
2706 foi de 13.75%.

2707 No curto prazo, a lucratividade do empreendimento foi mensurada por meio do
2708 Lucro operacional (LO), ou seja, é a sobra financeira após descontar os desembolsos com
2709 o COT (Martin et al., 1998).

2710

$$2711 \quad \text{LO} = \text{RB} - \text{COT}$$

2712

2713 O índice de lucratividade (IL) é elaborado em função do fluxo de caixa, o retorno
2714 (ou não) monetário em função do valor desembolsado. Assim, como critério de decisão o
2715 investimento é considerado inviável quando o valor encontrado é maior que 1 (Correia
2716 Neto, 2019).

2717

$$2718 \quad \text{IL} = \frac{\sum \text{VP}_{\text{positivo}}}{\sum \text{VP}_{\text{negativo}}}$$

2719

2720 O VPL utilizou os valores futuros estimados pelo projeto ajustados à TMA ao
2721 período de referencia para tomada de decisão (Correia Neto, 2019), ou seja, o ano zero.
2722 Adicionalmente, Bordeaux-Rêgo (2013) afirma que como critério de decisão, o VPL
2723 positivo indica recuperação do capital investido à TMA escolhida e geração de riqueza.

2724

2725
$$VPL = \sum_{n=1}^t \frac{VP_n}{(1+i)^n}$$

2726

2727 A TIR, que representa o potencial de retorno do projeto em termos percentuais, é
 2728 utilizada de forma análoga a TMA. O resultado encontrado indica se o projeto poderá ser
 2729 aceito (TIR>TMA) ou rejeitado (Correia Neto, 2019).

2730

2731
$$0 = \sum_{n=1}^t \frac{VP_n}{(1+TIR)^n}$$

2732

2733 A TIRM reflete o retorno esperado de forma mais realista por levar em conta as
 2734 diferentes taxas de reaplicação dos valores gerados.

2735

2736
$$TIRM = \sqrt[n]{\frac{VF}{VP}} - 1$$

2737

2738 O PBD corresponde ao de retorno do investimento, descrito em anos, com relação
 2739 ao custo do capital (Correia Neto, 2019).

2740 Os preços de venda do camarão ao final da engorda bem como a produção
 2741 costumam variar entre os ciclos de produção. Para o empreendedor, estas oscilações
 2742 implicam em incerteza. Correia Neto (2019) descreve que a impossibilidade de prever
 2743 com exatidão os resultados é o que caracteriza a incerteza.

2744 Com o objetivo de mensurar as incertezas, Correia Neto (2019) descreveram a
 2745 metodologia de análise de cenários com uma abordagem fundamentada na ocorrência de
 2746 variações das diferentes situações em que o projeto pode si deparar. No geral, a análise
 2747 de cenários trabalha com os seguintes premissa: pessimista, de ocorrência provável e o
 2748 otimista. Contudo, ao analisar os resultados produtivos de outros autores (Silveira et al.,
 2749 2020; Silveira et al., 2022; Krummenauer et al., 2011; Samocha, 2019) observou-se que
 2750 na salinidade adotada seria possível melhorar os resultados de produção. Assim, com
 2751 respeito a produção, os cenários foram estabelecidos em 15% e 30% acima da produção
 2752 obtida. Com relação aos preços, por meio da plataforma “CAMARADA” (aplicativo
 2753 utilizado no monitoramento dos preços de venda do camarão marinho desenvolvido pela
 2754 Associação Brasileira Criadores de Camarão, ABCCAM) foi possível observar que em

2755 relação ao preço de venda admitido neste estudo (corresponde a variação ocorrida no ano
 2756 de 2022), o incremento da variação dos preços foi positivo, logo, os cenários para os
 2757 preços foram os aumentos de 15% e 30%. O último foi elaborado na possibilidade de
 2758 ocorrência simultânea do aumento de da produção (15%) e do preço (30%).

2759 RESULTADO

2760

2761 Valores de quantidade e custos dos sais utilizada no processo de salinização estão
 2762 descrito na Tabela 1. Ao final do processo de salinização, adotou-se como valor de
 2763 trabalho a concentração foi de 20 g/L e para cada metro cúbico de água foram gastos R\$
 2764 20,09. Os sais apresentaram influências diferentes na composição do custo no processo
 2765 de salinização. A necessidade do cloreto de sódio para salinização representa 68,09% do
 2766 total utilizado. No entanto, quando relacionado com custo de aquisição este composto
 2767 representa o segundo maior custo. O cloreto de magnésio ($MgCl_2$) que, em termos de
 2768 quantidade utilizada, é aproximadamente cinco vezes menor que o cloreto de sódio
 2769 ($NaCl$), representa o maior custo de aquisição. A relação entre sulfato de sódio (Na_2SO_4)
 2770 e brometo de potássio(KBr) retrata a diferença entre a relação custo e quantidade. O
 2771 sulfato de sódio apresenta necessitou quantidade 38 vezes superior ao brometo de
 2772 potássio, contudo, em relação ao custo, este insumo tem preço 49,66% superior ao sulfato
 2773 de sódio. Logo, o brometo de potássio é terceiro elemento com maior impacto no custo
 2774 seguido do sulfato de sódio (Kester et al., 1967).

2775

2776 **Tabela 1** – Descrição dos compostos e a quantidade utilizados no processo de salinização
 2777 da água para cada metro cúbico (m^3), bem como, os custos referentes a quantidade
 2778 necessária para subir a salinidade para 20g/L.

Salinidade	Quantidade (kg/m^3)	Preço* (R\$/ m^3)	Participação em relação a quantidade (%)	Participação em relação ao peso (%)
Sulfato de Sódio (Na_2SO_4)	2,28	2,92	11,35	11,88
Cloreto de Potássio (KCl)	0,38	1,22	1,89	4,96
Bicarbonato de Sódio ($NaHCO_3$)	0,11	0,26	0,55	1,06
Brometo de Potássio (kBr)	0,06	4,37	0,30	17,78
Ácido Bórico (H_3BO_3)	0,02	0,07	0,10	0,28
Fluoreto de Sódio (NaF)	0,002	0,05	0,01	0,20
Cloreto de Magnésio ($MgCl_2$)	2,9	6,53	14,44	26,57
Cloreto de Cálcio ($CaCl_2$)	0,64	1,22	3,19	4,96
Cloreto de Estrôncio ($Sr Cl_2$)	0,014	2,06	0,07	8,38
Cloreto de sódio ($NaCl$)	13,68	5,88	68,09	23,92

Total	20,09	24,58	100	100
-------	-------	-------	-----	-----

2779 *Preço é referente ao ano de 2019.

2780

2781 Os dados relativos as variáveis de qualidade de água durante os ciclos produtivos
 2782 estão sumarizadas na Tabela 2. Temperatura, oxigênio dissolvido e sólidos sedimentáveis
 2783 apresentaram diferenças significativa ($p < 0,05$) entre os tanques de cultivos. Contudo,
 2784 tanto temperatura como oxigênio estavam dentro da faixa ótima para maximização do
 2785 desempenho do camarão e da atividade microbiana (Hargreaves, 2013; Samocha, 2019).
 2786 Já para nitrito, mesmo não existindo diferença significativa ($p > 0,05$) foram observados
 2787 valores acima do nível de segurança (Lin e Chen, 2003) o pode ter afetado os resultados
 2788 zootécnico nos dois tanques de produção.

2789

2790 **Tabela 2** - Resultados dos parâmetros de qualidade de água (média $\pm$ desvio padrão) ao
 2791 longo do ciclo produtivo de 64 e 78 dias, respectivamente, nos tanques de engorda.

	Tanque_A	Tanque_B
Temperatura (°C)	29,21 $\pm$ 1,29 ^a	28,49 $\pm$ 1,83 ^b
Oxigênio (mg.L ⁻¹)	5,30 $\pm$ 0,51 ^a	5,12 $\pm$ 0,58 ^b
pH	7.76 $\pm$ 0.19	7.83 $\pm$ 0.27
NH ₃ (mg.L ⁻¹)	0,05 $\pm$ 0,05	0,08 $\pm$ 0,09
NO ₂ ⁻ (mg.L ⁻¹)	7,66 $\pm$ 9,03	9,06 $\pm$ 9,55
NO ₃ ⁻ (mg.L ⁻¹)	57,58 $\pm$ 35,91	73,23 $\pm$ 53,05
Alcalinidade (mg.L ⁻¹ de CaCO ₃)	132,50 $\pm$ 16,69	131,21 $\pm$ 16,73
SS (mg.L ⁻¹)	21,97 $\pm$ 6,95 ^a	11,38 $\pm$ 2,85 ^b

2792 Letras diferentes indicam diferença estatística entre as médias ($p < 0,05$)

2793

2794 O maior peso médio de despesca (no tanque B) foi responsável pelo melhor
 2795 resultados de biomassa, produtividade, visto que, as densidades foram as mesmas e a
 2796 sobrevivência no tanque B foi menor que A. O tanque A apresentou melhor conversão
 2797 alimentar e sobrevivência (Tabela 3).

2798

2799 **Tabela 3** - Resultados das variáveis zootécnicos da produção do *L. vannamei* em sistema
 2800 BFT com o uso de salinização artificial nos tanques de engorda. ao longo do ciclo
 2801 produtivo de 64 e 78 dias.

	Tanque_A	Tanque_B
Peso inicial (g)	1,19	1,19
Peso final (g)	14,82	19,76

Ganho de peso semanal (g)	1,50	1,77
Biomassa inicial (kg)	86,91	86,53
Biomassa final (kg)	908,58	1075,57
FCA	1,47	1,50
Produtividade (kg/m ³)	3,1	3,72
Sobrevivência (%)	84,62	83,06

2802

2803

2804 O maior gasto ficou por conta da construção, mais especificamente o processo de
 2805 construção dos tanques de engorda juntamente com a geomembrana que tiveram os
 2806 maiores impactos na fase de implantação, isso porque, esta etapa envolve movimentação
 2807 de terra, construção de comportas e aquisição e instalação da geomembrana (Tabela 4).

2808 As estufas e a instalação do sistema de aeração apresentaram forte influência sobre
 2809 o valor de investimento. Para as estufas além da aquisição da estrutura foi necessário a
 2810 contratação de mão de especializada. Para a instalação do sistema de aeração, além dos
 2811 compressores de ar e mangueiras rugosas o sistema necessita de compra de tubulação,
 2812 conexões e instalações elétricas para o adequado funcionamento.

2813

2814

2815 **Tabela 4** - Descrição dos principais desembolsos para a implantação do sistema BFT para
 2816 operar com 300 camarões.m² e o valor gasto no processo de salinização artificial (20g/L).

Descrição	Unidade	Qtde	Total (R\$)	Participação (%)
Construção			104.049,17	60,75
<i>Tanques de engorda de geomembrana</i>	m ²	795	55.650,00	32,49
<i>Estufa</i>	m ²	1113	46.490,01	27,14
<i>Sistema de drenagem</i>	Unid.	1	1.909,16	1,11
Obra Complementares			7.559,00	4,41
<i>Casa de bombas</i>	m ²	6	4.998,00	2,92
<i>Instalação elétricas</i>	Unid.	1	2.561,00	1,50
Análise de água			3.520,00	2,06
<i>Sonda multiparametro</i>	Unid.	1	2.950,00	1,72
<i>Refratômetro</i>	Unid.	1	130,00	0,08
<i>Cone de Imhoff</i>	Unid.	2	440,00	0,26
Sistema de aeração			27.649,89	16,14
<i>Compressor radial</i>	Unid.	3	18.319,89	10,70
<i>Aerotube</i>	M	466,5	9.330,00	5,45
Bombas			8.097,00	4,73
<i>Gerador</i>	Unid.	1	5.860,00	3,42

<i>Motobomba</i>	Unid.	1	1.737,00	1,01
<i>Instalação elétricas</i>	Unid.	1	500,00	0,29
Diversos			855,90	0,50
Salinização			19.541,10	11,41
Total			171.272,06	100,00

2817 *Diversos: rede de despesca, puças, balanças de biometria, balança de despesca, caixa
2818 d'água e tarrafa
2819 Todos os valores são referentes ao ano 2019.
2820

2821 Entre os itens inerentes ao COE, ração representou o maior desembolso, seguido
2822 de mão de obra. O gasto com a mão de obra considerou a contratação de um responsável
2823 técnico e um responsável pela rotina de alimentação e coleta de parâmetros de qualidade
2824 de água (Gráfico 1).

2825

2826 **Gráfico 1** – O custo operacional efetivo de produção engloba todos os insumos utilizados
2827 juntamente com a mão de obra sem os encargos durante o ciclo produtivo de 128 dias.

2828

2829 *Outros: Alcalinizantes (cal hidratada e bicarbonato), melão, hipoclorito de cálcio.

2830

2831 Os resultados apontaram que com aproximadamente três ciclos por ano seria
2832 possível obter uma produção anual de 5.952,45 kg (Tabela 5). A receita foi diretamente
2833 influenciada pelos preços de venda, nesse caso, como a despesca dos camarões ocorreu
2834 com pesos diferente (14,82g e 19,76g) os preços de venda foram de R\$24,00 e R\$29,00.
2835 Nestas condições, o custo de produção ficou 19,05% acima da receita bruta o que gerou
2836 consequentemente um lucro operacional negativo (R\$-24.343,90). Com relação a
2837 remuneração do capital investido, índice de lucratividade (IL), mostrou que ao final do
2838 período avaliado, não houve remuneração do capital investido (-1,47).

2839 Na condição avaliada, o ponto de nivelamento demonstrou que para igualar a
 2840 receita bruta com o custo total de produção seria necessário aumentar a escala de
 2841 produção (mantendo todos os resultados zootécnicos constante) em pelo menos 16,23%
 2842 ou aumentar o preço de venda por quilograma de camarão produzidos para R\$30,80.

2843

2844 **Tabela 5** - Resultado produtivo do *L. vannamei* considerando três ciclos de produção por
 2845 ano em sistema BFT com salinização artificial.

Variáveis	Resultados
Produção (kg)	5.952,45
Preço médio de venda (R\$/kg)	26,71
Receita bruta (R\$)	158.992,35
Custo total de produção (R\$)	183.336,25
Lucro operacional (R\$)	-24.343,90
Índice de lucratividade	-1,47
Ponto de nivelamento (kg)	6.918,35
Custo médio de produção (R\$.kg ⁻¹)	30,80

2846 Os preços de venda foram retirados do aplicativo de monitoramento de preço de venda
 2847 do camarão CAMARADA.

2848

2849 Os resultados dos indicadores de rentabilidade ressaltam que no período de 10
 2850 anos o retorno gerado pelo empreendimento foi influenciado pelo custo de produção,
 2851 produção e preço de venda. Nesse sentido, o resultado estimado no VPL identificou que,
 2852 em relação ao critério de decisão a taxa mínima de atratividade, TMA, (ou seja, a Selic
 2853 de 13,75%), investir nessa condição no sistema BFT com salinização artificial não haveria
 2854 geração de riqueza isso porque as taxas geradas pelo empreendimento (TIR e MTIR) são
 2855 menores que a TMA. Além disso, no período estipulado não foi possível por meio do
 2856 fluxo de caixa constatar o retorno do capital investido.

2857

2858 **Tabela 6** - Resultados dos indicadores de rentabilidade do empreendimento considerando
 2859 três ciclos de produção por ano do cultivo do *L. vannamei* em sistema BFT com
 2860 salinização artificial.

VPL	-313.584,77
TIR	-
TIRM	-20,21%
Payback	-
Payback Descontado	-

2861

2862 Na simulação de cenários foi possível observar uma melhora dos indicadores de
 2863 rentabilidade, contudo apenas, na hipótese de aumento simultâneo da produção e preço

2864 (respectivamente, 15% e 30%) o resultado apresentou viabilidade com VPL (85.394,97)
 2865 positivo; TIR e TIRM (24,96% e 18,52 %) superior a TMA (13,75%) e payback
 2866 descontado de quatro anos. O aumento simultâneo da produção e preço produziu a menor
 2867 relação entre quanto deve ser produzido para quitar todo o CTP. Nesta condição, para
 2868 quitar o CTP seria necessário utilizar 79,73% da produção (Tabela 7).

2869 Os incrementos isolados da produção e do preço impactaram na melhoria dos
 2870 resultados dos indicadores de viabilidade do empreendimento comparados à condição
 2871 determinística. Os aumentos provocados em 30% da produção e do preço de venda
 2872 impactaram positivamente na TIR e TIRM. Contudo, a quantidade de camarão produzida
 2873 nestas circunstâncias e utilizada para saldar o CTP é diferente. Nesta situação, o
 2874 incremento do preço (30%) por não gerar aumento do dispêndio (ou novos) fez com que
 2875 a quantidade utilizada para quitar o CTP fosse menor. Na hipótese de aumento da
 2876 produção esta não ocorre de forma isolada é preciso aumentar o volume de insumos
 2877 utilizados para manter o nível de produção.

2878 O Valor do IL apresentou resultado positivo e com melhor desempenho quando o
 2879 aumento ocorre nos preços. Já os cenários produzidos com os aumentos isolados com
 2880 15% da produção e 15% do preço não tiveram nenhum efeito sobre a receita bruta (RB).
 2881 No LO, resultado da diferença entre a RB e CTP, o resultado com o aumento de 15% no
 2882 preço causou uma melhora, mas ao aumentar a produção (15%) há a necessidade de
 2883 aumentar outros insumos (por exemplo, pl's e ração) aumentando com isso o CTP, assim,
 2884 nesta situação, o aumento da produção teve efeito negativo.

2885

2886 **Tabela 7** - Análise de cenários considerando o aumento de 15% e 30% sobre a produção
 2887 e o preço de venda por quilograma de camarão; e o aumento sucessivo de 15% na
 2888 produção e 30% no preço sobre os indicadores Valor presente líquido (VPL); Taxa interna
 2889 de retorno (TIR); Taxa interna de retorno modificada (TIRM); Payback descontado
 2890 (PBD); Produção (Prod); Receita Bruta (RB); Custo total de produção (CTP); Lucro
 2891 operacional (LO); Índice de Lucratividade (IL); Ponto de nivelamento (PN).

	15_Prod	30_Prod	15_Preço	30_Preço	15_Prod_30_Preço
VPL (R\$)	- 237.903,07	-56.256,26	- 191.354,89	-32.456,04	85.394,97
TIR (%)	-	5,85	-16,33	9,26	24,96
MTIR (%)	-15,38	9,21	-11,89	11,33	18,52
PBD (anos)	-	10	-	9	4
Pro (kg)	6.845,32	8.898,91	5.952,45	5.952,45	6.845,32
RB (R\$)	182.841,20	237.693,56	182.841,20	213.844,71	245.921,42
CTP (R\$)	192.817,19	213.184,51	183.980,17	184.817,27	194.520,35
LO (R\$)	-9.975,98	24.509,05	- 1.138,97	29.027,44	51.401,06

IL	-0,61	1,44	-0,08	1,71	3,04
PN (kg)	7.276,12	8.044,70	6.037,09	5.185,31	5.457,54
PN (R\$)	28,17	23,96	30,91	31,05	28,42

2892

2893 **DISCUSSÃO**

2894 Os resultados de oxigênio e temperatura estão de acordo com a faixa considerada
 2895 ideal para otimizar o crescimento do *L. vannamei*. Conforme Samocha (2019) o melhor
 2896 desempenho do camarão marinho ocorre quando a temperatura está entre 28 °C a 30 °C e
 2897 o oxigênio entre 4.0 a 8.0 mg.L⁻¹. Já para os compostos nitrogenados Lin and Chen (2001,
 2898 2003) esclarecem que o efeito da toxicidade da amônia e do nitrito estão relacionados
 2899 com salinidade. Nesse sentido, os valores encontrados para amônia e nitrito mostram que
 2900 os resultados foram adequados para os cultivos.

2901 É importante salientar que os trabalhos realizados por Maicá et al. (2012), Moura
 2902 et al. (2021) e Pinto et al. (2020) apresentaram resultados semelhantes para amônia
 2903 (dentro da faixa de 0,02 a 1,75 mg.L⁻¹).

2904 Já para o nitrito, Moura et al. (2021) conseguiram controlar os picos em água de
 2905 baixa salinidade (3,0 a 13 g/L) por meio das estratégias de fertilização com melaço
 2906 (37,30% de carbono) e adição de água do mar. Pinto et al. (2020) relataram protocolo
 2907 semelhante, entretanto, a etapa de fertilização ocorreu 30 dias antes do início do
 2908 povoamento com melaço e para manter as diluições da água do mar constante utilizou
 2909 sais comerciais. Maicá et al. (2012) relatam que em baixa salinidade a dificuldade para
 2910 manter o nitrito no nível de segurança pode ser causa de mortalidade.

2911 Com relação aos resultados zootécnicos, os valores encontrados neste estudo
 2912 ratificam os valores relatados por Pinto et al. (2020) que trabalharam com salinidade
 2913 semelhante à deste estudo. Além disso, os autores optaram por densidade de 250
 2914 camarões.m⁻³ com o povoamento iniciando quando os animais alcançaram peso de 1,10
 2915 g. No presente estudo, o ciclo no tanque de engorda iniciou com camarões 1,19 g de peso
 2916 médio e com densidade de 300 camarões.m⁻².

2917 Com relação ao ganho de peso médio semanal (GPS) Pinto et al. (2020) relataram
 2918 que os valores ficaram entre 1,0 e 1,3 g; enquanto neste estudo os valores estão entre 1,50
 2919 e 1,77 g. O mesmo ocorreu para os resultados de conversão alimentar e sobrevivência.

2920 Ao comparar os resultados encontrados neste relato com outros trabalhos
 2921 realizados em sistema BFT sem a utilização de salinização artificial, os resultados dos
 2922 indicadores zootécnicos mostram-se adequados. Krummenauer et al. (2011) relataram

2923 que o cultivo de *L. vannamei* em densidade de 300 camarões.m⁻² apresentou menor GPS
2924 que o encontrado nesta pesquisa. Contudo, o mesmo autor alcançou melhores valores de
2925 CCA (1,29) e de produtividade (4,09 kg.m²) para a mesma densidade. No presente estudo,
2926 os resultados foram 1,47 e 1,50 (CCA) e 2,1 e 3,72 (produtividade), respectivamente.

2927 Nos parâmetros de qualidade água é possível verificar que os valores de nitrito
2928 oscilaram com picos de 16.69 mg.L⁻¹ e 18.47mg.L⁻¹. Segundo Lin e Chen, (2003) o LC₅₀
2929 para salinidade entre 15 e 25 g/L é 6.10 mg.L⁻¹ e 15.2 0 mg.L⁻¹, respectivamente. Logo,
2930 durante o ciclo produtivo, os animais estavam em situação de estresse causado pelo
2931 excesso de nitrito no ambiente, interferindo no resultado de CCA e produtividade.

2932 Com respeito ao investimento, os valores demonstraram que os maiores custos
2933 ficaram por conta da construção da unidade produtiva. Rego et al. (2017) relataram que
2934 o custo com este item representou 37,12%. Almeida et al. (2021) descreveram que ao
2935 investir no sistema BFT na região Sul do Brasil seriam necessários9,02% do total do
2936 investimento apenas com a construção da unidade produtiva.

2937 O custo operacional efetivo avaliado nesse estudo foi afetado principalmente pelos
2938 gastos com mão de obra e ração, sendo que estes dois itens representam 72,12% do COE.
2939 A ração, insumo com maior impacto, correspondeu a 37,95% do total do COE. Rego et
2940 al. (2017) ao avaliar o cultivo do camarão marinho em sistema BFT no estado de
2941 Pernambuco descreveram que a ração teve resultado próximo ao encontrado neste
2942 trabalho (37,89 %). Contudo, de Almeida et al. (2021) ao avaliarem o a produção em BFT
2943 com 400 camarões.m² encontraram que a ração correspondeu a 57,54% do custo de
2944 produção, adicionalmente, o gasto com alimentação mais a mão de obra representaram
2945 74,60%.

2946 A relação entre produção e preço de venda afetou o resultado da receita bruta,
2947 visto que, como relatado por alguns autores (Silveira et al., 2020; Krummenauer et al.,
2948 2011) o sistema BFT tem como característica a alta capacidade produtiva. Além disso, ao
2949 considerar o custo médio de produção (R\$ 31,80/kg) é possível constatar que, em média,
2950 o preço de venda para o *L. vannamei* no sistema avaliado está abaixo do custo médio de
2951 produção. Logo, o ponto de nivelamento identifica a necessidade de ser tecnicamente
2952 mais eficiente no uso dos insumos, visto que há a necessidade do aumento da produção
2953 para custear o custo total de produção (CTP), porém, sem alterar a relação de gastos.

2954 Quando aos indicadores de rentabilidade, Almeida et al. (2021) e Rego et al.
2955 (2017) encontraram resultados que atestam que o sistema BFT apresenta resultados
2956 favoráveis na escolha como opção de investimento. Os autores afirmam que o VPL e TIR

2957 apresentaram valores superiores a TMA. É importante ressaltar que os valores de TMA
2958 descritos foram de 10.25% (Almeida et al., 2021) e 10% (Rego et al., 2017a). Já para este
2959 estudo, os resultados de VPL, TIR e TIRM foram inferiores ao critério de tomada de
2960 decisão (TMA de 13,75%). Adicionalmente, dentro do período avaliado, não será
2961 possível obter o retorno do investimento.

2962 Os cenários avaliados indicam uma melhora dos indicadores econômicos com o
2963 aumento da produção, produção e preço simultaneamente. Contudo, é importante destacar
2964 que o aumento da produção implica também no aumento do COE já que é necessário
2965 aumentar a quantidade de insumos utilizados. Em relação aos preços, seu incremento
2966 implica no aumento da receita, porém é importante verificar a ocorrência de taxaço sobre
2967 estes. Além disso, os preços de venda do *L. vannamei* podem variar em relação ao
2968 tamanho, período do ano e entre regiões.

2969 Em relação à produção, o simples aumento da densidade pode não ser o suficiente
2970 para aumentar a produção visto que pode haver um efeito negativo nos resultados
2971 zootécnicos. Krummenauer et al. (2011) relatam que o aumento da densidade de 300
2972 cam.m⁻² para 450 cam.m⁻² causou o aumento da conversão alimentar, redução do ganho
2973 de peso semanal, sobrevivência, produtividade e biomassa. No entanto, Silveira et al.
2974 (2022) ao avaliar o efeito da despesca parcial como estratégia para a produção do camarão
2975 marinho, relataram que, ao realizar uma ou duas despescas parciais, foi possível alcançar
2976 valores de produtividade entre 5,85 e 6,22 kg.m⁻² para um cultivo com 500 cam.m⁻².

2977 É importante destacar que o investimento na carcinicultura praticada nos mais
2978 diversos sistemas deve estar atento às variações de preços, particularmente para o sistema
2979 BFT o impacto da variação dos preços pode afetar a viabilidade do empreendimento, pois,
2980 como afirmam Hanson et al. (2013) e Hargreaves (2013), o alto custo para investir e
2981 operacionalizar este sistema pode vir a ser obstáculo.

2982 **CONCLUSÃO**

2983 A produção em sistema BFT com salinização artificial mostrou que tecnicamente
2984 é possível obter excelentes resultados produtivos, contudo, em relação a investir os
2985 resultados indicam a necessidade da dependência de preços atraentes, isto porque os
2986 custos de produção e investimento ainda são elevados principalmente com relação ao
2987 gasto com alimentação.

2988

2989

2990 **REFERÊNCIAS**

- 2991 Bordeaux-Rêgo, R. et al, 2013. Viabilidade econômico-financeira de projetos, 4^o. ed. Rio
2992 de Janeiro.
- 2993 Boyd, C.A., Chaney, P.L., Boyd, C.E., Rouse, D.B., 2009. Distribution of ground water
2994 suitable for use in saline-water aquaculture in central and west-central Alabama. J.
2995 Appl. Aquac. 21, 228–240. <https://doi.org/10.1080/10454430903114048>.
- 2996 Boyd, C.E., 2002. Dissolved Salts in Water for Inland , Low-Salinity Shrimp Culture 40–
2997 45.
- 2998 Boyd, C.E., Thunjai, T., 2003. Concentrations of major ions in waters of inland shrimp
2999 farms in China, Ecuador, Thailand, and the United States. J. World Aquac. Soc. 34,
3000 524–532. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2003.tb00092.x>.
- 3001 Chen, S., Ling, J., Blancheton, J.P., 2006. Nitrification kinetics of biofilm as affected by
3002 water quality factors. Aquac. Eng. 34, 179–197.
3003 <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.09.004>.
- 3004 Correia Neto, J.F., 2019. Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento.
- 3005 Kester, I. Duedall, D. Connors, R.P., 2011. Preparation of Artificial Seawater. Am. Soc.
3006 Limnol. Oceanogr. 12, 176–179.
- 3007 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Fóes, G.K., Rosas, V.T., Wasielesky,
3008 W., 2022. The effect of partial harvest on production and growth performance of
3009 *Litopenaeus vannamei* reared in biofloc technologic system. Aquaculture 546.
3010 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737408>.
- 3011 Silveira, L.G.P., Krummenauer, D., Poersch, L.H., Rosas, V.T., Wasielesky, W., 2020.
3012 Hyperintensive stocking densities for *Litopenaeus vannamei* grow-out in biofloc
3013 technology culture system. J. World Aquac. Soc. 51, 1290–1300.
3014 <https://doi.org/10.1111/jwas.12718>.
- 3015 Almeida, M.S., Carrijo-Mauad, J.R., Gimenes, R.M.T., Gaona, C.A.P., Furtado, P.S.,
3016 Poersch, L.H., Wasielesky, W., Fóes, G.K., 2021. Bioeconomic analysis of the
3017 production of marine shrimp in greenhouses using the biofloc technology system.
3018 Aquac. Int. 29, 723–741. <https://doi.org/10.1007/s10499-021-00653-1>.
- 3019 Ebeling, J.M., Timmons, M.B., Bisogni, J.J., 2006. Engineering analysis of the
3020 stoichiometry of photoautotrophic, autotrophic, and heterotrophic removal of
3021 ammonia-nitrogen in aquaculture systems. Aquaculture 257, 346–358.
3022 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.03.019>.
- 3023 FAO, 2022. World Fisheries and Aquaculture, FAO:Rome,2022.
- 3024 FAO, 2018. The state of world fisheries and aquaculture- meeting the sustainable
3025 development goals. ROMA.
- 3026 Hanson, T., Ph, D., Morris, T., 2013. Economic Analyses Project Rising Returns For
3027 Intensive Biofloc Shrimp Systems. Glob. Aquac. Advocate 2011–2013.

- 3028 Hargreaves, John A, 2013. Biofloc Production Systems for Aquaculture Southern
3029 regional aquaculture center. SRAC Publ. 1–12.
- 3030 Hargreaves, J.A., 2006. Photosynthetic suspended-growth systems in aquaculture. *Aquac.*
3031 *Eng.* 34, 344–363. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.009>.
- 3032 Krummenauer, D., Peixoto, S., Cavalli, R.O., Poersch, L.H., Wasielesky, W., 2011.
3033 Superintensive culture of white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in a biofloc
3034 technology system in Southern Brazil at different stocking densities. *J. World*
3035 *Aquac. Soc.* 42, 726–733. <https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2011.00507.x>.
- 3036 Krummenauer, D., Samocha, T., Poersch, L., Lara, G., Wasielesky, W., 2014. The reuse
3037 of water on the culture of pacific white shrimp, *Litopenaeus vannamei*, in BFT
3038 system. *J. World Aquac. Soc.* 45, 3–14. <https://doi.org/10.1111/jwas.12093>.
- 3039 Li, E., Wang, X., Chen, K., Xu, C., Qin, J.G., Chen, L., 2017. Physiological change and
3040 nutritional requirement of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei* at low
3041 salinity. *Rev. Aquac.* 9, 57–75. <https://doi.org/10.1111/raq.12104>.
- 3042 Lin, Y.-C., Chen, J.-C., 2001. Acute toxicity of ammonia on *Litopenaeus Vannamei*
3043 Boone juveniles at different salinity levels. *J. Exp. Mar. Bio. Ecol.* 259, 109–119.
- 3044 Lin, Y.C., Chen, J.C., 2003. Acute toxicity of nitrite on *Litopenaeus vannamei* (Boone)
3045 juveniles at different salinity levels. *Aquaculture* 224, 193–201.
3046 [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(03\)00220-5](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(03)00220-5).
- 3047 Maicá, P.F., de Borba, M.R., Wasielesky, W., 2012. Effect of low salinity on microbial
3048 floc composition and performance of *Litopenaeus vannamei* (Boone) juveniles
3049 reared in a zero-water-exchange super-intensive system. *Aquac. Res.* 43, 361–370.
3050 <https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2011.02838.x>.
- 3051 Martin, N.B., Serra, R., Oliveira, M.D.M., Ângelo, J.A., Okawa, H., 1998. Sistema
3052 integrado de custos agropecuários - CUSTAGRI. *Informações Econômicas* v. 28,
3053 n.1 28, 7–28.
- 3054 Miranda, F.R., Lima, R.N., Crisóstomo, L.A., Santana, M.G.S., 2008. Reuse of inland
3055 low-salinity shrimp farm effluent for melon irrigation. *Aquac. Eng.* 39, 1–5.
3056 <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2008.04.001>.
- 3057 Moura, P.S. de, Wasielesky, W., Serra, F. da P., Braga, A., Poersch, L., 2021. Partial
3058 seawater inclusion to improve *Litopenaeus vannamei* performance in low salinity
3059 biofloc systems. *Aquaculture* 531, 735905.
3060 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735905>.
- 3061 Pinto, P.H.O., Rocha, J.L., do Vale Figueiredo, J.P., Carneiro, R.F.S., Damian, C., de
3062 Oliveira, L., Seiffert, W.Q., 2020. Culture of marine shrimp (*Litopenaeus vannamei*)
3063 in biofloc technology system using artificially salinized freshwater: Zootechnical
3064 performance, economics and nutritional quality. *Aquaculture* 520.
3065 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734960>.
- 3066 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017a. Financial viability of inserting
3067 the biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* farm: a case study

3068 in the state of Pernambuco, Brazil. *Aquac. Int.* 25, 473–483.
3069 <https://doi.org/10.1007/s10499-016-0044-7>.

3070 Rego, M.A.S., Sabbag, O.J., Soares, R., Peixoto, S., 2017b. Risk analysis of the insertion
3071 of biofloc technology in a marine shrimp *Litopenaeus vannamei* production in a farm
3072 in Pernambuco, Brazil: A case study. *Aquaculture* 469, 67–71.
3073 <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.12.006>.

3074 Samocha, T.M., 2019. Sustainable Biofloc Systems for, Sustainable Biofloc Systems for
3075 Marine Shrimp.

3076 Saoud, I.P., Davis, D.A., Rouse, D.B., 2003. Suitability studies of inland well waters for
3077 *Litopenaeus vannamei* culture. *Aquaculture* 217, 373–383.
3078 [https://doi.org/10.1016/S0044-8486\(02\)00418-0](https://doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00418-0).

3079 Valenti, W.C., Barros, H.P., Moraes-Valenti, P., Bueno, G.W., Cavalli, R.O., 2021.
3080 *Aquaculture in Brazil: past, present and future.* *Aquac. Reports* 19, 100611.
3081 <https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2021.100611>.

3082 Wyk, P. Van, Davis-Hodgkins, M., Laramore, R., Main, K.L., Mountain, J., Scarpa, J.,
3083 1999. *Farming Marine Shrimp in Recirculating Freshwater Systems.* Harb. Branch
3084 *Oceanogr. Inst.* 4520 pages.

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

3100 O sistema de bioflocos apresenta elevada capacidade produtiva, porém o aumento
3101 da densidade sem o devido planejamento pode prejudicar os indicadores zootécnicos e
3102 causar perdas econômicas. Os resultados descritos no Capítulo I demonstram que ao
3103 adotar uma densidade hiperintensivo em sistema de biofoco é importante estar atento
3104 para os ganhos de produtividade e, principalmente, para a melhor relação entre
3105 custo/benefício, visto que, o incremento da densidade pode acarretar em efeitos negativos
3106 sobre os resultados zootécnicos (como redução do peso final e aumento do fator de
3107 conversão alimentar, FCA) que levam ao aumento dos custos de produção e,
3108 consequentemente, afeta a viabilidade do empreendimento.

3109 A literatura científica atribui a tecnologia de BFT diversas estratégias produtivas.
3110 O capítulo II trata da análise de rentabilidade do projeto que adote deste sistema com as
3111 práticas de despescas parciais contra despescas total. Nesse caso, foi possível observar
3112 que, mesmo não havendo diferenças significativa entre os pesos finais entre as diferentes
3113 táticas, o melhor resultado financeiro foi alcançado no cenário de duas despescas parciais.
3114 Isso ocorreu devido ao melhor preço médio de venda e menor custo médio de produção.

3115 O capítulo III mostra a influência do sistema de produção e como estes são
3116 impactados por diversos fatores, como: variações de preços (insumos e produtos),
3117 concorrentes, localização do empreendimento e o peso de venda. Além disso, é possível
3118 integrar sistemas diferentes com o intuito de reduzir a vulnerabilidade dos
3119 empreendimentos perante as incertezas.

3120 A salinização é um método de produção recente que tem como vantagem a
3121 possibilidade de tornar a produção de camarão marinho independente da fonte de água
3122 (no caso, água marinha). O método aliado a tecnologia de biofoco permite a atingir
3123 produtividade elevada e a reutilização da água por vários ciclos. Contudo, os resultados
3124 encontrados demonstram que ainda é que apresente estes benefícios o sistema carece de
3125 melhores resultados econômicos para viabilizar o sistema.

3126 No geral, a análise de fluxo de caixa, investimento e de custos constituem um
3127 importante instrumento de avaliação na tomada de decisão isso porque a viabilidade
3128 técnica não implica necessariamente na melhor situação financeira é confrontar os
3129 resultados técnicos com os resultados econômicos. Além disso, a análise de fluxo de caixa
3130 e de custos permitem identificar quais elementos, dentro de uma situação determinística,
3131 mais impactam sobre os resultados monetários. Já no caso da análise de investimento, os

3132 resultados podem ser condensados em indicadores que podem ser comparados com outros
3133 possíveis investimentos ou estratégias de produção na etapa de tomada de decisão.

3134

3135 **SUGESTÃO DE NOVAS PESQUISAS**

3136 A maximização dos sistemas de produção passar pela otimização da densidade
3137 ideal, assim, para próximos trabalhos, sugere-se a avaliação de densidade que maximizem
3138 os resultados zootécnicos, bem como, alteração do manejo alimentar com maior
3139 frequência alimentar com intuito de diminuir a competição e a dispersão dos pesos médios
3140 finais. Adicionalmente, é importante avaliar o efeito da ração considerando os diferentes
3141 teores de proteínas sobre a performance dos indicadores zootécnicos dos animais.

3142 A metodologia de despescas parciais mostrou-se um instrumento poderoso para
3143 viabilizar o sistema de produção que utilizar a tecnologia de bioflocos, porém, por meio
3144 da diferença entre o crescimento esperado e o real ficou evidente que, ao longo do ciclo
3145 produtivo, as despescas parciais não maximizaram o crescimento compensatório, desta
3146 forma, visando melhorar além dos resultados zootécnicos os resultados econômicos, é
3147 importante avaliar as diferentes densidade sobre a perspectivas da despescas parciais e
3148 incluir a avaliação entre o crescimento esperado e real para identificar o melhor retorno
3149 de crescimento com redução do fator de conversão alimentar (FCA).

3150 Com relação a salinização, devido ao crescimento da produção de camarão
3151 marinho, especialmente nas águas continentais, esta pode ser uma importante ferramenta
3152 para inicial a produção de pós-larvas e torná-la independente do ambiente costeiro.

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

ANEXO

3163

QUESTIONÁRIO PARA CARCINICULTORES/PISCICULTORES - 2015/2016

3164

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR

3165

3166 1. Data da Entrevista: ____/____/____ 2. Fazenda/Município: _____

3167 3. Pessoa Entrevistada: _____ 4. Cargo: _____

3168

3169 5. Idade:

3170 i) Até 30 anos: ____ ii) 30 a 50 anos: ____ iii) mais de 50 anos: _____

3171

3172 6. Grau de Instrução:

3173 i) Não lê nem Escreve: _____ ii) Assina o nome: _____

3174 iii) Lê e Escreve: _____ iv) Curso Primário: _____

3175 v) Curso Secundário: _____ vi) Curso Superior: _____

3176

3177 7. Vc participou de algum treinamento ou capacitação durante o ano de 2015/2016? _____

3178 Que tipo? _____

3179

3180 8. Vc recebeu ou pagou para ter assistência técnica de algum órgão ou profissional especializado durante o

3181 ano de 2015/2016? ____ Qual a frequência? _____ Quanto pagou? ____ R\$/mês

3182

3183 9. Que nota vc daria para o nível tecnológico de desenvolvimento de sua atividade ou propriedade durante

3184 o ano de 2015/2016? (escala de zero a dez) _____

3185

3186 10. Há quanto tempo se dedica à atividade (experiência)?

3187

3188 i) Menos de 2 anos: ____ ii) de 2 a 6 anos: ____ iii) mais de 6 anos: ____

3189

3190

PARTE II – INVENTÁRIO DA FAZENDA

3191

3192 A) INVENTÁRIO DA TERRA

3193

3194 5. Área total da fazenda (ha): _____ 6. Área física total com viveiros (ha): _____

3195 7. Valor da terra nua (R\$/ha): _____ 8. Área de viveiros em utilização (ha): _____

3196

3197 B) INVENTÁRIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

3198

ESPECIFICAÇÃO	Idade	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Vida Útil Futura (Anos)
Motobombas				
Carro-de-Mão				
Balanças				
Freezer				
Geladeira				
Carroça				
Carreta				
Trator				
Caminhão				
Microscópio				
Oxímetro				
Refratômetro				
pHmetro				
Aeradores até 2 HP				
Aeradores > 2 HP				
Tubos/Canos				
Outras Máquinas				

Ferramentas Diversas				
Rede de Pesca				
Artes de Pesca				
Caixas de Isopor				
Gerador				
Soprador de AR				
Comedouros				
Canoa/barco				
TOTAL	xxx	Xxxxx		Xxxxxx

3199
3200
3201

C) INVENTÁRIO DAS BENFEITORIAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE

ESPECIFICAÇÃO	Idade	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Vida Útil Futura (Anos)
Poços				
Tanque Berçário				
Sistema Aclimação*				
Infraestrutura. Berçário**				
Viveiros Engorda				
Canais				
Abastecimento				
Drenagem				
Canal de Cimento				
Comportas (Entrada)				
Comportas (Saída)				
Casa de Bomba				
Escritório				
Casa de Empregados				
Cercas				
Instalações Elétricas				
Galpão				
Depósitos				
TOTAL	xxxx	xxxxxxx		Xxxxxxxx

3202
3203
3204
3205
3206

* Caixa d'água, aerador, sistema de mangueira/tubulação.

** Dormitório de técnicos, minilaboratório, banheiros, caixa de despesa, etc.

D) INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE INSUMOS

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Utilização na Atividade
Ração tipo 1				
Ração tipo 2				
Fertilizante tipo 1				
Fertilizante tipo 2				
Calcário Dolomítico				
Cal Virgem				
Hipoclorito/Cloro				
Correias de Bomba				
Peças em Geral				
Telas em Geral				
Caixas de Isopor				
Tubos PVC				
Canos				
Embalagens				
TOTAL	xxx	Xxxx		xxxxxxx

3207

3208 **PARTE III – MÃO DE OBRA ANUAL COM A ATIVIDADE PRODUTIVA**
 3209 **(2015/2016)**

3210
 3211
 3212

A) PERMANENTE (Inclusive Familiar, se for o caso). **Não incluir o Empresário**

ESPECIFICAÇÃO	No. Pessoas	Salário*	Valor Total Anual (R\$)
1) Setor Administração			
-			
2) Setor Operacional			
-			
3) Setor de Vigilância			
-			
4) Outros			
-			
TOTAL	Xxxxxxx	xxxxxxx	

3213 * Inclusive encargos sociais, produtividade, vale transporte, lanche, etc.

3214
 3215
 3216

B) TEMPORÁRIA EM 2015/2016 (Inclusive Familiar, se for o caso). **Não incluir o Empresário**

ATIVIDADE	No. Pessoas	No. de Diárias	Diária*	Valor Total(R\$)
Despesa				
Manutenção de talude				
Manutenção de Viveiros				
Assist. Técnica Especial				
Comercialização				
Transporte em geral				
TOTAL	xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	

3217 * Inclusive outros benefícios (Transporte, lanche, refeição, etc.), se for o caso.

3218

3219 **PARTE IV – OUTRAS DESPESAS ANUAIS COM A ATIVIDADE PRODUTIVA**

3220

Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Mínimo/Máximo (R\$/Unid.)	Preço Médio (R\$/Unid.)	Valor Total (R\$)
Compra de Pós-larvas					
Ração tipo 1					
Ração tipo 2					
Fertilizante tipo 1					
Fertilizante tipo 2					
Adubo Orgânico 1					
Adubo Orgânico 2					
Calcário Dolomítico					
Cal Virgem					
Hipoclorito/Cloro					
Energia Elétrica					
Combustível					
Lubrificantes					
Análise Química Água					
Desp. C/Comercialização					
Desp. de Transportes					
Desp. de Embalagens					
Reparos Máquinas					
Reparos Equipamentos					
Reparos Benfeitorias					
Aluguel de Máquinas					
Outros Aluguéis					

Taxa CIMA/COMPESCAL					
Outras Taxas					
Impostos e Encargos					
ITR					
FUNRURAL/CESSR					
FINSOCIAL					
- PIS					
- FGTS					
- INSS					
- ICMS					
- Imp. Renda P Jurídica					
- IBAMA					
- SEMACE					
- DPU (União)					
TOTAL	xxxxx	xxxxx		Xxxxxxxx	

3221

3222 **PARTE V – RECEITA TOTAL ANUAL (2015/2016)**

3223

3224

3225

A) PRODUÇÃO CONCLUÍDA

Viveiro	Área (ha)	Ciclos Conduzidos	Produção/Ciclo (kg)	Produção Total* (kg)	Preço** (R\$/kg)	Valor (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL	Xx	Xxx			Xxx	

3226

*Produção total anual, incluindo autoconsumo, doação, pagamentos de empregados e serviços.

3227

** Preço efetivamente recebido pelo produtor. **Identificar o preço mínimo:**

3228

3229 R\$/kg: _____ período _____.

3230

preço

máximo:

3231

R\$/kg: _____ período _____.

3232

3233

B) OUTRAS RECEITAS ANUAIS EM 2015/2016

3234

3235

Vendas de Pós-larvas R\$ _____

3236

Aluguel de máquinas, aparelhos e equipamentos..... R\$ _____

3237

Aluguel de Berçário _____ R\$ _____

3238

Outros (especificar) _____ R\$ _____

3239

Outros (especificar) _____ R\$ _____

3240

TOTAL R\$ _____

3241

3242

PARTE VI - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPRESÁRIO

3243

3244 A) Caso o Sr. **desistisse** da atual atividade (ou não estivesse envolvido com ela), com o seu treinamento
 3245 empresarial, com a sua experiência e com as oportunidades de emprego e trabalho vigentes atualmente,
 3246 **qual seria o valor** de uma remuneração que o Sr. consideraria **NORMAL e POSSÍVEL** de ser obtida
 3247 pelos os seus SERVIÇOS como empresário ou como produtor? R\$/mês _____; R\$/ano
 3248 _____ .

3249 PARTE VII - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

3250 1. Sem utilização de tratamento biológico:

Técnicas	Idade	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Vida Útil Futura (Anos)
Bacia de sedimentação				
Filtro físico				

3251

Técnicas	Área (m ²)	Custo de instalação (R\$)	Custo total da instalação (R\$)	Custo unitário (R\$/m ²)	Custo total
Uso de geomembranas de PVC					
Uso de telas proteção					

3252

3253 2. Com utilização de tratamento biológico:

Técnicas	Unidade.	Quantidades por ciclo	Custo (unitário)	Custo (total)
Uso de probióticos				
Uso de melação				

3254

3255 3. Caracterização da gestão/administração das propriedades rurais.

Caracterização da Administração			
Práticas		Valor	
		SIM	NÃO
X ₁	Para iniciar o negócio fez algum projeto	1	0
X ₂	Faz Planejamento da Produção (mensal ou anual)	1	0
X ₃	Faz Exploração do Negócio como Proprietário ¹	1	0
X ₄	Realiza algum tipo de controle de qualidade dos produtos	1	0
X ₅	Registrou a sua Empresa (junta comercial)	1	0
X ₆	Anotação para a Tomada de Decisões (livro caixa, diário, IR, dentre outros)	1	0
X ₇	Utiliza instrumentos para Organização contábil-administrativa ²	1	0
X ₈	Faz Levantamento de Custos	1	0
X ₉	Responsável Pelas Anotações é o Proprietário ³	1	0
X ₁₀	Possui Consultoria externa (advogado, contador, cooperativa)	1	0
X ₁₁	Compra de matéria-prima (insumos) em estabelecimentos especializados ⁴	1	0
X ₁₂	Vende os produtos diretamente no mercado varejista ⁵	1	0
X ₁₃	As despesas particulares são separadas das despesas para a produção	1	0
X ₁₄	Participou de treinamento e capacitação na atividade (cursos e palestras)	1	0
X ₁₅	Contratou assistência técnica particular	1	0

3256

1. Faz exploração com mais de um proprietário, como arrendatário ou meeiro.

3257

2. Utiliza escritório de contabilidade, da cooperativa ou do sindicato ou profissional da área ou familiares.

3258

3. Quem faz anotações são familiares do proprietário e/ou funcionários.

3259

4. Compra de insumos na cooperativa, atravessadores e/ou comércios locais.

3260

5. Vende os produtos na porteira, para o mercado atacadista, cooperativa e/ou atravessadores.

3261

3262 PARTE VIII – POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAS DE FINANCIAMENTO

3263

1. Quais **políticas públicas** poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva dos produtores da região? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa.

3264

3265

3266

Ações de Política	Grau de importância			
Programas de capacitação profissional e treinamento técnico	(0)	(1)	(2)	(3)
Melhorias na educação básica	(0)	(1)	(2)	(3)
Programas de apoio a consultoria técnica	(0)	(1)	(2)	(3)
Estímulos à oferta de serviços tecnológicos	(0)	(1)	(2)	(3)
Programas de acesso à informação (produção, tecnologia, mercados, etc.)	(0)	(1)	(2)	(3)
Linhas de crédito e outras formas de financiamento	(0)	(1)	(2)	(3)
Incentivos fiscais	(0)	(1)	(2)	(3)
Programas de estímulo ao investimento (venture capital)	(0)	(1)	(2)	(3)
Outras (especifique):	(0)	(1)	(2)	(3)

3267

3268

2. Você utilizou crédito agrícola ou outra forma de financiamento para a atividade nos últimos anos?

3269

3270

() Sim () Não

3271

3272

Se **SIM**, Informe (mesmo que o agricultor já tenha pago o empréstimo tomado):

3273

Ano	Custeio/Invest	Montante (R\$)	Pagamentos (R\$)	A Pagar (R\$)

3274

3275

3. Indique os **principais obstáculos que limitam o acesso do produtor as fontes externas de financiamento**: Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa.

3276

3277

Limitações	Grau de importância			
Inexistência de linhas de crédito adequadas às necessidades da empresa	(0)	(1)	(2)	(3)
Dificuldades ou entraves burocráticos para se utilizar as fontes de financiamento existentes	(0)	(1)	(2)	(3)
Exigência de aval/garantias por parte das instituições de financiamento	(0)	(1)	(2)	(3)
Entraves fiscais que impedem o acesso às fontes oficiais de financiamento	(0)	(1)	(2)	(3)
Outras. Especifique	(0)	(1)	(2)	(3)

3278

3279